

비타비스정

【원료약품 및 그 분량】

티아민질산염 (KP)	7.0mg
리보플라빈 (KP)	5.0mg
피리독신염산염 (KP)	15.0mg
시아노코발라민 (KP)	2.0ug
니코틴산아미드 (KP)	20.0mg
판토텐산칼슘 (KP)	6.0mg
아스코르브산 (KP)	100.0mg
토코페롤아세테이트 50%(KPC)	30.0mg
(비타민E로서 15IU)	
엽산(KP)	50.0ug

【성 상】 적갈색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

- 1) 육체피로, 임신, 수유기, 병중 · 병후의 체력 저하시, 노년기의 비타민 B2, B6, B12, C의 보급
- 2) 다음증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염, 각기, 눈의 피로

【용법 · 용량】 성인 1일 2회, 1회 2정씩 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고있는 환자
 - 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
(구역, 구토, 설사, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg~2000mg의 용량을 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성장애를 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애) 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
5. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 2) 요를 황색으로 변화하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하시기전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (<http://www.kmspharm.com>)에서 확인 할 수 있습니다.

작성년월일 : 2006.01.01

개정년월일 : 2009.01.21