

알보린정 5mg

(염산레보세티라진 5mg)

전문약품

분류번호 : 141

성 상

흰색 또는 미황색의 타원형 필름코팅정제

성분 · 함량

이 약 1정 중

염산레보세티라진(별규) 5mg

효능 · 효과

다음 질환의 증상 완화

1. 계절성 알레르기성 비염 또는常年성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함)
2. 만성 특발성 두드러기
3. 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코티손 외용제와 병용)

용법 · 용량

성인 및 6세 이상의 소아 : 식사에 상관없이 1회 1정(염산레보세티라진으로써 5mg), 1일 1회 경구투여 한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

신장에 환자는 신장기능(크레아티닌 청소율(CLCr(ml/min)))에 따라 용량을 조절한다.

크레아티닌 청소율 CLCr(ml/min)		용량 및 횟수
경증	$50 \leq \text{CLCr} < 80$	1회 1정, 1일 1회
중등증	$30 \leq \text{CLCr} < 50$	1회 1정, 2일 1회
중증	$10 \leq \text{CLCr} < 30$	1회 1정, 3일 1회

사 용 상 의
주 의 사 항

1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 성분 및 히드록시진에 대해 과민증이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 신부전 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 4) 6세 미만의 유아
- 5) 드물게 일어나는 galactose intolerance, Lapp lactose deficiency, 혹은 glucose-galactose malabsorption의 유전적인 문제가 있는 환자에는 이 약을 투여해서는 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
- 2) 간장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
- 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중감, 흥분이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 나타날 수 있다.
- 3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
- 4) 혈액계 : 혈관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 임파구증가, 호산구증가, 드물게 단핵구증가, 혈소판증가, 혈소판감소가 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시스 쇼크, 때때로 부종, 드물게 발진, 소양감, 혈관부종이 나타날 수 있다.
- 6) 눈 : 드물게 시야흐림, 결막충혈이 나타날 수 있다.

- 7) 간 : 때때로 AST, ALT, Al-P, 총 빌리루빈의 상승이 나타날 수 있다.
 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있다.
 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명
 이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 과량투여 시 졸음이 나타날 수 있다.
 2) 과민 반응의 징후가 나타나면, 복용하지 않는다.
 3) 상용량을 복용할 경우, 민첩성이나 반응 시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나, 운전이나 기계
 조작 시에는 상용량을 초과하지 말아야 하며, 약물에 대한 반응을 고려해 투여하여야 한다.

5. 상호작용

- 1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않는다.
 2) 테오필린(1일 400mg)과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한 감소를 보였다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물 실험결과 기형발생이 보고 된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.
 2) 모유를 통해 분비되므로 수유 중에는 투여를 금하여야 한다.

7. 소아에 대한 투여

6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다
 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나
 휴약하고 적절한 처치를 한다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르겐 피내반응을 억제하므로 알레르겐 피내반응검사를 실시하기 3-5일 전에는 이 약을
 투약하지 않는 것이 바람직하다.

10. 과량투여 시의 처치

과량투여 시의 증상은 진정이다.

이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시한다. 단기간 과
 량투여 시 위 세척을 실시한다. 이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않는다.

포 장 단 위

300정

저 장 방 법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염
 되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서
 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

※ 설명서 개정연월일 : 2008.7.21
 P0811-01

제조의회사 :



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
 소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
 학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조자 :



한림제약주식회사

공정 : 경기도 용인시 처인구 유방동 1007