

【원료약품 및 그 분량】 1정중

로알젤리(KPC)	20mg
토코페롤아세테이트(KP)	45IU
아스코르브산(KP)	100mg
티아민염산염(KP)	5mg
리보플라빈(KP)	2mg
니코틴산아미드(KP)	40mg
피리독신염산염(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	12 μ g
건조난백분말(별규)	200mg
청색 1호, 적색 40호(KPTaCS)	적량

【성상】 황색~황갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시 노년기
이 약에 함유된 비타민등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨목결림, 수족저림·수족냉증

【용법·용량】 1회 1캡슐, 1일 3회 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1세 미만의 영아
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부, 수유부
- 이상반응
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.

- 레보도파
- 임상검사치에의 영향
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) • 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제조자】 (주)서흥캡셀 경기도 부천시 소사구 송내동 315, 317



제조의뢰자:

한국웨일스제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4

소비자상담실: 031-494-5995

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자(WA000302) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.