

제반 염증치료제

스토마신캡슐

【원료약품 및 그분량】 1캡슐(710mg) 중

우방자(KP)	500mg
연 교(KP)	835mg
강 활(JP)	250mg
감 초(KP)	250mg
길 경(KP)	500mg
석 고(생규)	1665mg
형 개(KP)	250mg
방 풍(KP)	500mg

건조엑스로서 685mg

【성 상】 갈색 분말이 든 상부 연청색, 하부 담청색의 불투명한 캡슐제

【효능·효과】 인후가 부어서 아픈 다음의 제증 : 편도염, 편도주위염

【용법·용량】 성인 및 15세 이상 : 1회 2캡슐, 7~14세 : 1회 1 1/3캡슐

4~6세 : 1회 1캡슐, 2~3세 : 1회 2/3캡슐, 2세 미만 : 1회 1/2캡슐

1일 3회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
3개월 미만의 유아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
 - 부종이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인
 - 몸이 허약한 사람(체력이 쇠퇴해 있는 사람, 몸이 약한 사람)
 - 위장이 약해서 설사를 쉽게 하는 사람(설사하기 쉬운 사람)
 - 지금까지 약에 의해 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - 다음의 증상이 있는 사람 : 부종
 - 다음의 진단을 받은 사람 : 고혈압, 심장병, 신장병
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰

(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- 4) 과민증 : 발진, 발적, 가려움 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우는 복용을 중지한다.
- 5) 소화기 : 식욕부진, 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
- 6) 5~6회 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 준수한다.
- 3) 소아에게 복용할 경우에는 보호자의 지도감독 아래 투여한다.
- 4) 1세 미만의 유아에게는 의사의 진료를 받아 투여하고, 부득이한 경우에만 투여한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병·의원을 통하여 교환하여 드립니다.

문서개정일 : 20090121



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 논현동 430-1 (02)597-1020

<http://www.i-pharm.kr>

