

정코존 120^{mg}

집중력장애·말초혈순환장애개선

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

은행엽엑스(KPC).....120.0mg

(충강고플라본배당체로서 28.8mg)

첨가제(타르색소) : 황색 4호, 청색 1호(KPTaCS)

【성 상】 녹색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 말초동맥순환장애(간혈성 파행증)의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3. 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】 성인

1. 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명 :
은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구 투여한다.
2. 기질성 뇌기능장애 :
은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약에 과민증이있는 환자.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 부작용 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 말것.
5. 임부에 대한 투여 동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
6. 소아에 대한 투여 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 말것.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)
→「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하여 주십시오

※문서개정년월 : 2009. 04

제조원



동인당제약주식회사

경기도 서울특별시 강남구 테헤란로 1248-1 (신사동) 1248-1033 (B3)
www.dongin-dang.co.kr
소비자상담실 ☎ 031-319-1990

우수약품제조관리기준
KGMP 적격인증업체

판매원



중 군 당

계열회사 경보제약