

속콜파워 연질캡슐

일반의약품
분류번호:114

효과 빠른 액상형 보조기약

꽃물 · 비충혈 · 재채기

인후통 · 두통 · 통증

발열

[성분 · 함량] 이 약 1캡슐 중

수도에페드린염산염(USP) 30.0mg

클로르페니라민말레산염(KP) 2.0mg

아세트아미노펜(KP) 250.0mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

[성 상] 미황색 내지 주황색의 액상 내용물이 든 투명한 주황색의 정방형 연질캡슐


[효능 · 효과] 감기의 증상상(꽃물, 비충혈, 두통, 통증, 재채기, 발열, 인후통)의 완화

[용법 · 용량]

1) 성인 : 1회 2캡슐씩 4시간마다 복용하며 1일 4회를 초과하지 않도록 하십시오.

2) 6~12세 어린이 : 1회 1캡슐씩 4시간마다 복용하며 1일 4회를 초과하지 않도록 하십시오.

3) 6세 이하 어린이 : 의사의 지시를 따르십시오.



본 제품은 어린이 보호용 안전포장을 사용하고 있습니다.

복용시,

① 가위 등으로 절취선을 따라 자르십시오.

② 접착이 안된 화살표부분을 잡고 화살표 방향으로 떼어 낸 후 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

폐기종 또는 만성기관지염과 같은 호흡기계 질환을 가지고 있거나 노폐물, 전립선의 비대로 인해 배뇨곤란, 심장질환, 고혈압, 당뇨병, 갑상선질환을 가지고 있을 경우 의사와 상담한 후 투약하십시오.

3. 이상반응

1) 신경통, 현기증 또는 불면이 나타나면 사용을 중지하고 의사에게 상담하십시오.

2) 인후통이 심하여 2일 이상 지속되거나 발열, 발진, 두통, 오심, 구토 등을 동반할 경우 즉시 의사에게 상담하십시오.

이는 특히 어린이에게 있어 과도흥분을 유발할 수 있습니다.

3) 이 약은 졸음을 유발할 수 있으며 알코올, 진정제, 신경안정제 등은 졸음효과를 상승시킵니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법용량을 따르십시오.

2) 치료 7일 이내에 증상의 개선이 없거나 발열증상이 나타나면 의사에게 상담하십시오.

3) 이 약을 복용하는 동안 알코올성 음료는 마시지 마십시오.

4) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

5) 운전하거나 기계를 작동하고 있을 때는 주의하십시오.

6) 어떤 증상이 나타나지 않더라도 약물복용에 주의하십시오.

5. 상호작용

1) 진정제나 신경안정제를 복용하고 있을 경우 이 약을 투여하지 마십시오.

2) MAOI계 약물을 복용하고 있거나 중단한지 2주 내에는 이 약을 투여하지 마십시오.

처방받는 약물이 MAOI 약물인지 알 수 없을 경우에는 의사에게 상담하십시오.

6. 입산부나 수유부의 경우에는 이 약을 투약하기 전에 의사와 상담하십시오.
7. 과량을 복용했을 경우에는 즉시 의사와 상담하거나 독극물 센터에 상담하십시오.

8. 다음 사항은 복용하지 마십시오

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

9. 복용 시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은 땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
 - ④ 황달 또는 전신이 부종, 혈소판, 단백뇨 등의 증상이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 최종 개정연월일(2009년 5월 26일)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 개정연월일 : 2009_05_26
P0907-01

제조의회사 :



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조자 :



알엔피코리아(주)

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6