

근육경련 및 혈액순환을 동시에-

마그롤

연질
캡슐

- 안면 근육 경련(마그네슘 결핍)
- 팔다리 저림 및 경련
- 말초혈행장애
- 갱년기시 증상 완화

【원료약품의 분량】 1캡슐(1,210mg) 중

토포페롤아세테이트(KP)	200mg
(비타민E로서 200IU)	
산화마그네슘(KP)	250mg
(마그네슘으로서 150mg)	
티아민질산염(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	6mg
피리독신염산염(KP)	1mg
니코틴산아미드(KP)	50mg

*첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호

【성상】 황색의 점조성 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐체

【효능·효과】

- 비타민 E, B1, B2, B6의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족저림·수족냉증
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부부염
- 각기, 눈의 피로, 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 성인 및 12세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지말것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 중증의 신부전 환자
- 4) 임부
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 수유부
- 3) 심장, 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장에 환자
- 5) 저단백 혈증 환자
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 홍반, 부전수축, 중추 신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가 될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(Neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(Glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(Hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다. 가) 인산염, 갈슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나) 레보도파 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【소비자상담실】 080-024-0030

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준)적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2009년 12월 29일)이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-0030)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 최종개정연월일 : 2009년 12월 29일

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭-보고마당-안전성정보-의약품 유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

【제조원】 (주)서흥캡셀 / 경기도 부천시 소사구 송내동 315, 317번지

【판매원】 광동제약(주) / 경기도 평택시 모곡동 440-2번지