

피부 경화증 및 페이로니씨 병 치료제

페이론 캡슐

(아미노벤조산칼륨)

페이로니씨병(음경만곡증)이란 음경백막에 생긴 섬유화된 결절로 인해 발기 시 음경 만곡을 일으키는 질환입니다. 이는 발기 시 동통을 일으키며 음경 변형이 심한 경우 질내 삽입에 지장을 주게 됩니다. 이러한 신체적 정신적 영향으로 발기부전을 동반하기도 하는 페이로니씨병을 치료하기 위해서는 약물 치료가 1차적으로 시행됩니다.

페이론 캡슐은 피부 조직에서 oxygen uptake(산소 유입)를 조절함으로써 항섬유화 작용을 나타냅니다. 피부의 섬유화는 과량의 serotonin의 분비나 monoamine oxidase(MAO)의 활성도가 떨어짐으로써 진행됩니다. MAO가 적절하게 작용하기 위해서는 산소의 적절한 공급이 필요한데, 아미노벤조산칼륨은 피부 조직으로의 산소 공급을 증가시켜 MAO의 활성을 강화시킴으로써 섬유화를 억제하고 치료해 줍니다. 미국 FDA에서 페이로니씨병 치료에 승인한 유일한 경구제이며 안전성이 뛰어나서 장기복용시에도 부작용이 거의 없습니다. 이러한 치료기전 때문에 기타의 다른 피부경화증에도 효과적인 약물입니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

아미노벤조산칼륨(USP) 500mg

[성 상]

미황색의 분말이 들어있는 상하부 불투명 흰색의 경질캡슐

[효능 · 효과]

피부경화증, 페이로니씨병(음경만곡증)의 치료

[용법 · 용량]

1일 4회, 1회 6캡슐씩 복용한다. 식후 또는 가벼운 식사 후 위장장애를 방지하기 위하여 충분한 양의 음료와 함께 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 설폰아미드계 제제를 복용하는 환자
- 2) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 단식, 식욕부진, 오심환자
- 2) 신장기능장애 환자
- 3) 간기능장애 환자

3. 이상반응

식욕부진, 오심, 발열, 발진이 드물게 발생할 수 있다. 이 경우에 투여를 중단하면 그 증상은 사라진다. 이 약에 대한 민감성이 사라지면 투여를 재개한다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 효능·효과는 학술기관의 후향적 조사연구들을 근거로 한 것이다.
- 2) 저혈당증으로의 진행을 방지하기 위하여 단식, 식욕부진, 오심환자는 정상적 식이를 회복할 때까지 투여를 중지한다.

5. 상호작용

이 약은 설폰아미드계 제제와 병용투여시 약물의 효과를 감소시킨다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

이약의 임신중 또는 수유중 투여에 관한 안전성은 확립되지 않았다.

7. 소아에 대한 투여

이 약의 소아에 대한 안전성은 확립되지 않았다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하도록 한다.

[저장방법·사용기한] 밀폐용기, 25℃ 이하 보관, 36개월

[포장단위] 240캡슐, 30캡슐

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 문서작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 홈페이지(www.pharmbio.co.kr)의 제품정보 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 통해 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 : 02-587-2551(학술부)

설명서 작성년월일 : 09년 10월
PYC-11

제조판매자



[주] 한국팜비오

본사 : 서울시 강남구 도곡동 422-2

공장 : 충북 충주시 용탄동 620-20