

기미를 효과적으로 개선하기 위해서

1. 약 효과를 인식하기까지 적어도 1개월간은 복용하세요.
2. 자외선에 만성적으로 노출되면 기미, 주름 등 피부 노화를 일으킵니다. 여름에도 긴팔 셔츠를 입거나 모자, 선글라스, 양산을 사용하십시오. 또한 자외선차단 크림을 사용하는 등 자외선에 주의하십시오.

본 제품에 관한 문의는 구입 약국 또는 당사로 연락하십시오.

(주)아이월드제약 고객센터

경기도 안양시 동안구 호계 2동 898 신원비전타워 706호

전화 : 080-597-1020, 홈페이지 : www.i-pharm.kr

상담시간 : 9:00~17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

기미란?

[기미]에도 여러 타입이 있습니다. 크기와 형태, 색 등에 의한 종류가 있으며 그 중에는 여러 종류의 기미가 같은 장소에 생기는 일도 있습니다. 기미는 잘못된 치료를 하면 짙어지는 경우도 있기 때문에 우선 기미를 정확히 판별하는 일이 중요합니다. 여기서 대표적인 세가지 기미의 종류를 소개합니다.



노안성색소반(일광성검은점)

기미 중에서도 가장 많으며 이른 경우에는 20대에 생기는 경우도 자외선이 주요 원인이며 얼굴과 팔 등 노출이 많은 부분에 생긴다. 다른 피부와의 경계선이 확실한 갈색 기미



간 반

특히 30대에서 40대의 여성에게 많이 보이는 볼, 이마, 입 주변 등 얼굴 좌우대칭으로 생긴다. 옅은 갈색으로 얼굴에서 퍼지는 경향이 있는 기미. 자외선 이외에 여성 호르몬의 불균형이 간반의 원인되기도 합니다.



염증 후 색소침착

연령과 성별을 불문하고 화장품과 알레르기 등으로 트러블이 있는 후, 여드름 염증 후 생긴다. 서서히 열려져서 자연적으로 사라지지만 완치까지는 반년, 긴 경우에는 2년 정도 걸리는 일도 있다.

이 문서는 본제를 사용할시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.

정부공인
KGMP
일반의약품
문류번호 : 269

트랜美정

특장점

트랜미정은 기미에 효과가 있는 트라넥삼산을 배합한 국내 최초 신개념 기미치료 의약품입니다.

원료약품 및 그분량 1정(320mg)중

트라넥삼산(BP)	125mg	피리독신염산염(USP)	1mg
L-시스테인(DAB)	40mg	판토텐산칼슘(USP)	4mg
아스코르브산(USP)	50mg		

성상 흰색의 원형필름코팅정

효능 · 효과 기미

용법 · 용량

15세 이상 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

15세 미만은 복용하지 마십시오, 용법 용량을 엄수하여 주시기 바랍니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 트라넥삼산을 함유하는 내복약을 복용하고 있는 사람
- 2) 트롬빈을 투여 중인 사람
- 3) 중증(심한 증상) 신장애(신장장애) 및 간성훈수가 있는 사람
- 4) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
- 5) 혈전증이 있는 사람(뇌혈전, 심근경색, 혈전성정맥염, 폐색전증 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
- 3) 55세 이상의 사람
- 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 5) 약에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 6) 혈전증을 일으킬 우려가 있는 사람(이전에 혈전증에 걸린 적이 있는 사람, 가족이 혈전증을 일으킨 사람, 의서로부터 선천성 응고이상증을 지적받은 적이 있는 사람, 경구피임약 · 호르몬보충요법 등의 혈전증을 일으킬 우려가 있는 약을 복용하고 있는 사람)

7. 신장애(신장장애)가 있는 사람

8. 시스틴뇨증이 있는 사람

9. 자신의 검버섯이 본제(이 약)의 효능효과인 기미인지 아닌지 식별이 어려운 경우, 또 색이 거무스름하고, 색조가 불균일하고, 표면이 튀어나온 기미의

형태는 피부과의사에게 상담할 것

4. 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우는 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의할 것.

- 1) 피부 : 발진, 가려움
- 2) 소화기계 : 설사, 오심(구역), 구토, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 본제(이 약)는 혈전(혈액이 굳어진 것)을 용해하기(녹이기) 어렵게 하는 작용이 있으므로 혈전증의 초기증상(심한 두통 · 허의 꼬임, 10분 이상 가슴을 죄는 듯한 통증 · 갑작스런 숨참, 한쪽 종아리의 통증 · 부종(부기), 원인불명의 갑작스런 호흡곤란 · 가슴의 통증을 동반한 일과성(한번 나타나고 없어지는) 의식 소실(없어짐) 등에 주의할 것
- 2) 2개월 이상 계속 복용하지 말 것
- 3) 복용중지 후 재발하여 재복용시 최저 2개월 간격을 두어 복용하며 이때도 2개월 이상 복용하지 말 것
- 4) 기미 개선의 정도에는 개인차가 있으며, 효과가 있는 경우도 기미가 완전히 사라지지 않음.
- 5) 이 약의 복용에 의해, 뇨 및 대변의 검사치에 영향을 줄 수 있으므로 의사의 검사를 받은 경우는 비타민C를 함유하는 제제를 복용하고 있는 것을 의사에게 알려 줄 것.
- 6) 이 약의 과량 투여시 구역, 구토, 기립성 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있다. 구토유발, 위세척, 활성탄투여등의 일반적 처치를 시행한다. 신배설을 촉진시키기 위해 다량의 수액섭취를 유지한다. 혈전형성의 위험이 있는 사람은 항응고제치료를 고려한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
- 4) 젖은 손으로 취급하지 말 것
- 5) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것. 또 개봉 후에는 되도록 빨리 사용할 것

7. 기타

트라넥삼산을 개에게 장기간 대량투여 시 망막변화를 일으켰다는 보고가 있다.

저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장당위 180정

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.j-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

문서개정일 : 20091015