



알지엔스피드 연질캡슐 10mg

(세티리진염산염)

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오. 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【효능·효과】

계절성 및 다년성 **알레르기성 비염**, **알레르기성 결막염**, **만성 특발성 두드러기**, **피부소양증(가려움증)**

【용법·용량】

성인 및 6세 이상의 소아 : 세티리진염산염으로서 **1일 1회 10mg** 취침전에 경구투여(복용)합니다.
이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

액상이라 빠른 알레르기 치료제, 알지엔스피드연질캡슐

네오솔 특허공법으로 탄생한 액상형 알레르기 치료제로써
알약을 녹여 캡슐에 담아 치료효과가 빠릅니다.

- **알레르기성 비염** : 먼지, 꽃가루, 동물의 털 또는 음식물, 음식물 첨가제에 의한 재채기, 콧물, 코막힘 등의 증상 완화
- **피부가려움증** : 국소부위 또는 전신 가려움증의 치료
- **두드러기** : 원인을 알 수 없는 만성 두드러기 증상의 치료
- **알레르기성 결막염** : 알레르기 유발물질에 의한 결막 염증질환 완화



【원료약품 및 그 분량】 - 1캡슐 중 -

세티리진염산염(BP).....10.0mg

첨가제(식약청인정타르색소) : 적색3호, 청색1호

【성 상】 무색 내지 연보라색의 내용물이 든 보라색의 투명한 타원형 연질캡슐

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자분에게는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자분
 - 2) 신부전 환자분
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 4) 6세 미만의 유아(정제에 한함)
- 다음 환자분에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 신장장애(신장장애) 환자분(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)
 - 2) 간장애 환자분(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)
 - 3) 고령자(노인)(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다)

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가법고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중(머리무거움), 혼동이 나타날 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구갈(목아름), 구순(입술)건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순(입술)염, 미각이상 나타날 수 있습니다.
- 3) 순환기계 : 드물게 빈맥(빠른 맥), 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 혈액 : 맥관염(혈관염), 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단백 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 합니다.
- 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시 쇼크(과민성 쇼크), 때때로 부종(부기), 드물게 발진, 가려움, 맥관부종(혈관부기)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 눈 : 드물게 흐린 시력, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
- 7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ -GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상 : 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요장혈(피 섞인 소변)이 나타날 수 있습니다.
- 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈(코피), 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통(가슴통증), 드물게 월경불순, 이명(귀울림)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작 시에는 용량을 초과하지 않습니다.

5. 상호작용

다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여하지 않습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험결과 기형발생이 보고된 바 있으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않습니다.
- 2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여 중에는 수유를 중단합니다.

7. 소아에 대한 투여

- 1) 6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다(정제에 한함).

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량(줄임)하거나 휴약하고 적절한 처치를 합니다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시의 증상은 진정입니다. 이 경우 위세척을 실시합니다.

10. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

11. 기타

증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다.

【사용기간】 24개월입니다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염 되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

제조사 : 알엔피코리아(주) 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6/(주)대웅 계열사

제조외의뢰자 : (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10



제회 보건복지가족부 인증
가족친화 우수기업



주식회사 대웅제약
경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10

작성 연월일 : 2009.12.08
최종 개정 연월일 : 2009.12.08