

3세대 항히스타민제

레보세린[®] 정 (레보세티리진염산염)

Levocerin[®] Tab.

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중
 레보세티리진염산염(별규) 5mg

【성상】 백색 또는 미황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

다음 질환의 증상 완화

1. 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함)
2. 만성 특발성 두드러기
3. 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코티손 외용제와 병용)

【용법·용량】

성인 및 6세 이상의 소아: 식사에 상관없이 1회 1정(레보세티리진염산염으로서 5mg), 1일 1회 경구 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

신장에 환자는 신장 기능(크레아티닌 청소율(CL_{CR} (mL/min))에 따라 용량을 조절합니다.

크레아티닌 청소율 CL_{CR} (mL/min)		용량 및 횟수
경증	$50 \leq CL_{CR} < 80$	1회 1정, 1일 1회
중등증	$30 \leq CL_{CR} < 50$	1회 1정, 2일 1회
중증	$10 \leq CL_{CR} < 30$	1회 1정, 3일 1회

【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 성분 및 히드록시진에 대해 과민증이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 신부전 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 4) 6세 미만의 유아
 - 5) 드물게 일어나는 galactose intolerance, Lapp lactose deficiency, 혹은 glucose-galactose malabsorption의 유전적인 문제가 있는 환자에는 이 약을 투여해서는 안됩니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 신장장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
 - 2) 간장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
 - 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
3. 이상반응
 - 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중감, 흥분이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌, 소화불량, 복통, 위통, 복부 불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 나타날 수 있습니다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 혈액계 : 혈관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 임파구증가, 호산구증가, 드물게 단핵구증가, 혈소판증가, 혈소판감소가 나타날 수 있습니다.
 - 5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시스 속, 때때로 부종, 드물게 발진, 소양감, 혈관부종이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 눈 : 드물게 시야흐림, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 간 : 때때로 AST, ALT, Al-P, 총빌리루빈의 상승이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 과량투여시 졸음이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 과민 반응의 징후가 나타나면, 복용하지 않습니다.

3) 상용량을 복용할 경우, 민첩성이나 반응 시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나, 운전이나 기계조작시에는 상용량을 초과하지 말아야 하며, 약물에 대한 반응을 고려해 투여하여야 합니다.

5. 상호작용

- 1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않습니다.
- 2) 테오필린(1일 400mg)과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한 감소를 보였습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물 실험결과 기형발생이 보고 된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않습니다.
- 2) 모유를 통해 분비되므로 수유 중에는 투여를 금하여야 합니다.

7. 소아에 대한 투여

6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 합니다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르겐 피내반응을 억제하므로 알레르겐 피내반응검사를 실시하기 3-5일 전에는 이 약을 투약하지 않는 것이 바람직합니다.

10. 과량투여시의 처치

과량투여시의 증상은 진정입니다.

이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시합니다. 단기간 과량투여 시 위 세척을 실시합니다.

이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않습니다.

【포장단위】

자사포장단위(외부포장 표기 참조)

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 24개월

®=등록상표

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 최초일자(2009년 08월 27일)이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

소비자 상담실 : 080-990-8200

홈페이지 : www.yungjin.co.kr

제조의뢰 및 판매원 : 영진약품공업주식회사

공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5

제조원 : 한국맥넬티(주)

공장 : 경기도 화성시 동탄면 중리 713-2