

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

사용설명서

분류번호

269

일반의약품

KGMP

맑고 깨끗한 피부를 위한

더마화이트정[®]

더마화이트정은 색소세포인 멜라닌의 생성을 억제하여 기미와 같은 색소 침착증에 개선효과를 나타내며 피부 신진대사를 촉진하여 피부세포에 영양을 충분히 공급해 줍니다.

1. 더마화이트정의 주성분인 엘시스테인, 아스코르브산, 트라넥삼산은 알록의 원인인 멜라닌을 만드는 과정에 작용하여 멜라닌 생성을 억제하여 기미를 개선합니다.
2. 더마화이트정의 주성분인 엘시스테인은 멜라닌이 만들어지는 초기 단계에 멜라닌 합성효소인 Tyrosinase 활성 및 생성을 저해합니다.
3. 더마화이트정의 주성분인 아스코르브산은 엘시스테인과 함께 Tyrosinase의 활성을 억제하는 작용을 하며, 멜라닌에 대해서 직접 환원 작용을 나타내기도 합니다.
4. 더마화이트정은 엘시스테인의 작용을 돕는 판토텐산칼슘과 피라독신염산염을 함유하여, 멜라닌 색소의 침착을 방지합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

트라넥삼산(KP)	125mg
제피아스코르브산(KPC)	53mg
엘시스테인(DAB)	40mg
판토텐산칼슘(KP)	4mg
피라독신염산염(KP)	1mg

【성 상】 흰색 원형의 필름코팅정

【효능·효과】 기미

【용법·용량】

15세이상 1회 2정, 1일 3회 식후복용

15세 미만은 복용하지 마십시오. 용법 용량을 엄수하여 주시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 트라넥삼산을 함유하는 내복약을 복용하고 있는 사람
 - 2) 트롬빈을 투여 중인 사람
 - 3) 중증 신장에 및 간성혼수 환자
 - 4) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람
 - 5) 혈전증이 있는 사람(뇌혈전, 심근경색, 혈전성정맥염, 폐색전증 등)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
 - 3) 55세 이상의 사람
 - 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 5) 약에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 6) 혈전증을 일으킬 우려가 있는 사람(이전에 혈전증에 걸린 적이 있는 사람, 가족이 혈전증을 일으킨 사람, 의사로부터 선천성 응고이상증을 지적받은 적이 있는 사람, 경구피임약, 호르몬보충요법 등의 혈전증을 일으킬 우려가 있는 약을 복용하고 있는 사람)
 - 7) 신장에 환자, 시스틴노증인 경우에는 신중히 투여할 것
 - 8) 자신의 검버섯이 본제의 효능효과인 기미인지 아닌지 식별이 어려운 경우, 또 색이 거무스름하고, 색조가 불균일하고, 표면에 튀어나온 기미의 형태는 피부과 의사에게 상담할 것
3. 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우는 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 1) 피부 : 발진, 가려움
 - 2) 소화기계 : 설사, 오심, 구토, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림
4. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.
 - 1) 본제는 혈전혈액이 굳어진 것을 용해하기 어렵게 하는 작용이 있으므로 혈전증의 초기증상(심한 두통, 허의 꼬임, 10분 이상 가슴을 죄는 듯한 통증, 갑작스런 숨참, 한쪽 종아리의 통증, 부종, 원인불명의 갑작스런 호흡 곤란, 가슴의 통증을 동반한 일과성의 의식소실 등에) 주의할 것
 - 2) 2개월 이상 계속 복용하지 말 것
 - 3) 복용중지 후 재발하여 재복용시 최저 2개월 간격을 두어 복용하며 이때도 2개월 이상 복용하지 말 것
 - 4) 기미 개선의 정도에는 개인차가 있으며, 효과가 있는 경우도 기미가 완전히 사라지지 않음.
 - 5) 이 약의 복용에 의해, 뇨 및 대변의 검사치에 영향을 줄 수 있으므로 의사의 검사를 받은 경우는 비타민C를 함유하는 제제를 복용하고 있는 것을 의사에게 알려 줄 것.
 - 6) 이 약의 과량 투여시 구역, 구토, 기립성 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있다. 구토유발, 위세척, 활성탄투여 등의 일반적 처치를 시행한다. 신배설을 촉진시키기 위해 다량의 수액섭취를 유지한다. 혈전형성의 위험이 있는 사람은 항응고제치료를 고려한다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것
- 4) 젖은 손으로 취급하지 말 것
- 5) 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것 또 개봉 후에는 되도록 빨리 사용할 것

6. 기타

개에게 장기간 대량투여 시 망막변화를 일으켰다는 보고가 있다.

【포장단위】180정

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- * 오용을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- * 사용설명서 개정년월(2009년 10월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 080-024-5525)에서 확인하실 수 있습니다.

제조사 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동세면 남관리 200

◆ 제품문의처 : ☎ 080-024-5525
사용설명서 개정년월 : 2009. 10.