

비트리모 정

VITRIMO Tab.

일반의약품 분류번호:313

성 상 | 분홍색의 원형 정제

원료약품 및 그 분량 | 1정 중

폴산(KP) 250 μ g
시아노코발라민(KP) 500 μ g
피리독신염산염(KP) 50mg

효능 및 효과 |

1. 다음 경우의 비타민 B₆의 보급 :
 - 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력 저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

용법 및 용량 |

8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정

사용상의 주의사항 |

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의 할 것)
 - 1) 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

↓ 뒷면계속

KGMP적격업체



조아제약(주)
CHO-A PHARM CO., LTD.

본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
수신자부담고객상담실 : 080-988-8888

3. 부작용

- 1) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 이 약을 투여할 경우에는 레보도파와 병용(함께 복용(사용))투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포 장 단 위 200정

※ 간혹 제품표면에 검붉은 색의 점이 보이는 경우가 있으나, 주원료 중 하나인 시아노코발라민으로서 효능, 효과에는 이상이 없으므로 안심하고 복용하십시오.

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다. ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 정보마당 → 의약품 등 정보를 참조하십시오. ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 전달하십시오.

문안작성일 : 2010. 1. 26 (Rev.0)