

K G M P

적격업체제품

해독 · 종합감기약

일반의약품

분류번호:114

콜벤-에프 캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐중

아세트아미노펜(약전)	200mg	말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산클로페라стин(JP)	8mg	dl-염산메칠에페드린(약전)	8.75mg
무수카페인(약전)	20mg	세라티오펩티다제(고시)	3.33mg
질산치아민(약전)	4mg	리보플라빈(약전)	2mg

【성상】

엷은 황색의 과립 및 미백색의 장용성 과립의 혼합물이 든 상부 적색, 하부 백색의 경질캡슐제

【효능 및 효과】

감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 및 용량】

성인 : 1회 2캡슐, 어린이(8~14세) : 1회 1캡슐을 1일 3회, 식후 30분에 복용한다.

【사용상 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨 곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게는 복용시킬 경우 보호자의 책임 하에 복용시키십시오
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다

4. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 4) 장기 연용하지 마십시오.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오물을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】 자사포장단위 【사용방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



이 남 제 약

서울 : 서울특별시 동대문구 답십리동 488-338
 공장 : 경북 경산시 진량읍 신성리 1204
 TEL : (053)856-7711~5