| 전문의약품 |
| --- |
| 642 : 구충제 |

간·폐디스토마치료제

# 디스토시드®정

프라지퀀텔 600mg

지금까지 불치 또는 난치의 질환으로 알려진 디스토마감염증 치료제인 프라지퀀텔이 국내에서는 최초로 당사에 의해 원료합성에 성공하여 제품화하게 되었습니다. 디스토시드정은 이 프라지퀀텔을 주성분으로 한 최신의 디스토마감염증 치료제로서 국내외 임상에 의하면 1일 또는 2일 복용으로 100%의 치료효과를 나타내는 구충제입니다.

## 【성분·함량】

디스토시드정은 1정중 프라지퀀텔(유.에스.피.) 600mg을 함유합니다.

## 【성상】 백색 –미황색의 장방형 제피정입니다.

## 【효능·효과】

1. 모든 종류의 인체병원성 간흡충과 폐흡충 및 주혈흡충에 의한 감염증
2. 무구조충, 유구조충, 왜소조충, 남아메리카 어류조충등 각종 조충 감염증

## 【용법·용량】

1. 용법

조성물질의 맛이 약간 쓰기 때문에 정제를 씹지 않고 신속하게 물과 함께 복용하는 것이 좋습니다. 특별히 용량 조절을 위하여 정제를 분할하여 복용할 경우에는 식후에 복용하는 것이 좋습니다. 하루 수회 반복 복용시에는 각각의 투약 간격이 4시간 이하 및 6시간 이상이 되지 않도록 해야 합니다.

정제는 환자의 체중에 따라 정확하게 용량이 조절될 수 있도록 세개의 분할선을 가진 장원형으로 되어 있으며 분할선에 의한 4개의 조각들 속에는 각각 150mg의 활성물질이 함유되어 있습니다. 정제의 1/4이 필요한 경우에는 정제의 끝쪽에서 부터 엄지손가락의 손톱으로 분할선을 눌러 절단시켜 쉽게 사용할 수 있습니다.



■알기 쉬운 디스토시드®정 복용 안내

＊복용방법

| |
| --- |
| 간디스토마 감염증 치료 : 1일 3회, 식후 30분, 1일간 복용<br>폐디스토마 감염증 치료 : 1일 3회, 식후 30분, 2일간 복용 |

※매회 복용간격이 4~6시간 이내가 되도록 식사시간을 조절하시기 바라며, 처음 약물 복용은 아침식사후 30분 부터 시작하시는 것이 바람직합니다.

폐디스마토마 감염증 치료 경우에는 2일간 위와같은 방법을 반복하여 복용하십시오.

＊개인 몸무게 별 매회 복용량

| 몸무게(kg) | 처음 복용 정제수량 | 2회, 3회 |
| --- | --- | --- |
| 45~50 | 2정 | 처음과 같은량 매회 복용 |
| 51~56 | 2정 1/4 | 처음과 같은량 매회 복용 |
| 57~62 | 2정 반 | 처음과 같은량 매회 복용 |
| 63~68 | 2정 3/4 | 2정 반 |
| 69kg 이상 | 3정 | 2정 반 |

2. 용량

(1) 각종 흡충 감염증의 치료

용량은 의사의 지시에 따라 각각의 경우에 맞게 결정되어져야 하며, 치료되어야 할 기생충에 따라 체중 kg당 20~40mg을 1일 1회에서 3회까지로 나누어 복용되도록 합니다.

- 간디스토마, 후고흡충감염증 : 1회 25mg / kg씩 1일 3회 1일간 치료
- 폐디스토마감염증 : 1회 25mg / kg씩 1일 3회 2일간 연속적으로 치료
- 아프리카 주혈흡충증 : 40mg / kg 1회 또는 20mg / kg씩 2회 1일간 치료

● 체중에 따른 필요한 1회 복용 정제의 수량은 다음과 같습니다.

| • 간디스토마, 후고흡충, 폐디스토마감염증의 1회 25mg / kg복용 경우 | |
|---|---|
| 체중(kg) | 1회 복용 정제수 |
| 22~26 | 1 |
| 27~33 | 1 1/4 |
| 34~38 | 1 1/2 |
| 39~44 | 1 3/4 |
| 45~50 | 2 |
| 51~56 | 2 1/4 |
| 57~62 | 2 1/2 |
| 63~68 | 2 3/4 |
| 69~75 | 3 |

| • 아프리카주 혈흡충증의 1회 20mg / kg 복용경우 | |
|---|---|
| 체중(kg) | 1회 복용 정제수 |
| 20~25 / 26 | 3/4 |
| 26 / 27~33 | 1 |
| 34~41 | 1 1/4 |
| 42~48 | 1 1/2 |
| 49~56 | 1 3/4 |
| 57~63 | 2 |
| 64~70 | 2 1/4 |
| 71~78 | 2 1/2 |
| 79~86 | 2 3/4 |

(2) 각종 조충 감염증의 치료
단지 1회만 투여하면 됩니다.
㉠ 무구조충, 유구조충, 남아메리카 어류조충 감염의 치료
체중 1kg당 10mg을 복용합니다.(성인 및 12세이상 : 1 1/4 정, 6~11세 : 1/2 정, 2~5세 : 1/4 정)
㉡ 왜소조충 감염의 치료
체중 1kg당 15mg을 복용합니다(성인 및 12세이상 : 1 1/2 정, 6~11세 : 1정, 2~5세 : 1/2 정)

## 【사용상의 주의사항】

1. 금　　기 : 현재 금기로서 알려진 것은 없습니다.
2. 상호작용 : 현재까지 다른 약물과의 상호작용이 발견되지는 않았습니다.
3. 부 작 용
   1) 간혹 구역, 두통, 가벼운 수기와 함께 또는 이같은 증상들이 없이 복부 불쾌감을 나타낼 수 있습니다.
   2) 아주 드물게 피부소양증(담마진)및 체온상승을 나타낼 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 부작용은 체중 1kg당 약 40mg의 용량을 1회에 투약한 경우 더 자주 나타나는 수가 있습니다.
   2) 부작용은 대량의 기생충을 가지고 있는 환자의 경우 자주 또는 심하게 나타날 수 있습니다.
   3) 뇌주혈흡충증 또는 감염에 의해 야기된 병적 간기능에 의해 약물대사에 이상이 있는 환자의 경우 추가적인 주의를 필요케 하는 유해한 작용은 일어나지 않습니다.
   4) 인체낭충증이 있는 것으로 알려진 지역에서는 사용시 특별한 주의가 있어야 합니다. 왜냐하면 뇌낭충증의 경우에는 전문의에 의한 병원치료가 요구되어지기 때문입니다.
5. 임신중 및 수유기
   1) 프라지퀀텔이 동물실험을 통해 임산부나 태아에 어떠한 유해한 작용도 나타나지 않는 것으로 되어 있으나 임신중에는 약물의 사용을 제한한다는 일반원칙에 따라 임신 첫 3개월동안에는 복용되지 않아야 합니다.
   2) 수유부의 경우 수유중인 아기가 치료당일 및 그 뒤 72시간동안 별도의 방법으로 먹을것을 공급받을 수가 있다면 치료를 할 수 있습니다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온보관

**【포장단위】** 4, 8, 100, 500, 1000정(수출용)

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-0142
설명서 작성년월일 19830520
개정년월일 20000701

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191-2