전문의약품
114 : 해열 · 진통 · 소염제

진통 · 소염제
Analgesic Anti-Inflammatory Agent

리메시드정

RIMESID Tabs
Nimesulide 100mg

리메시드정은 여러 염증성질환에 효과를 나타내며, 위장관 장해가 적어 내약성이 우수한 비스테로이드성 진통 · 소염제 입니다.

【성분 · 함량】 1정중
니메술리드(식품의약품청고시)·····100mg

【성상】 미황색을 띤 원형정제

【효능 · 효과】
1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   월경곤란증, 치아조직의 염증, 골관절염(퇴행성 관절질환), 류마티양 관절염, 급성 상기도염, 수술후 통증

【용법 · 용량】
성인 1회 1/2~1정(니메술리드로서 50~100mg)을 1일 2회 경구투여합니다. 필요하면 1회 2정(200mg) 1일 2회까지 투여할 수 있습니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 환자에게 사용하지 마십시오.
   1) 소화성 궤양환자
   2) 이 약 또는 아스피린 등 비스테로이드성 소염진통제에 과민증 환자
   3) 위장출혈환자
   4) 임부, 수유부, 소아
   5) 간부전 환자
   6) 크레아티닌청소율이 30 mL/분 미만인 중증 신부전환자
   7) 중증의 혈액응고장애 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 고령자 특히 쇠약한 환자
   2) NSAIDs의 사용으로 신기능이 악화될 수 있으므로 신부전 또는 심부전 환자에는 주의가 필요합니다. 투약 전후 정기적으로 신기능 평가를 해야 합니다. 신기능이 악화된 경우 투약을 중단해야 합니다. 또한 혈액량이 감소할 수 있는 외과적 수술의 전후, 이뇨제 투여중 환자는 이뇨량 및 신기능에 주의합니다.
4. 부작용
이 약은 일반적으로 지시된 용량에서 내약성이 우수합니다.
   1) 소화기 : 때때로 경미하고 일시적인 가슴쓰림, 구역, 복통, 설사, 변비의 증상이 나타날 수 있습니다. 드물게 소화성궤양, 위장출혈, 천공, 혈변이 나타날 수 있습니다.
   2) 피부 : 드물게 알레르기성 피부반점, 삼출성 다형성 홍반, 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군)이 나타날 수 있습니다.
   3) 중추신경계 : 두통, 어지러움, 졸음이 나타날 수 있습니다.
   4) 호흡기 : 호흡곤란, 천식과 같은 아나필락시양 반응의 증례가, 주로 아스피린 및 다른 NSAIDs에 알러지성 환자에서 보고되었습니다.
   5) 간장 : 간수치 (트랜스아미나제, ALP, 또는 빌리루빈 증가)가 일시적, 가역적으로 상승할 수 있습니다. 담즙울체, 급성 간염을 포함한 중증의 간 부작용의 예가 발견되었습니다.
   6) 신장 : 핍뇨, 부종, 혈뇨, 신부전
   7) 혈액 및 림프계 : 자반증 (purpura) 및 혈소판감소증의 증례가 보고되었습니다.
5. 일반적 주의
   1) 출혈성 질환, 소화기 질환이 있는 환자 (위장관 손상, 궤양, 궤양성대장염, 크론씨병) 및 항응고제 또는 혈소판응집억제약물로 치료 중인 환자에는 주의하여 투여하십시오.
   2) 위 내약성을 제한하는 약물을 병용해야 할 환자는 반드시 의사의 엄중한 감독하에서 사용하십시오.
   3) 다른 비스테로이드성소염제에서 눈의 변화가 보고된 바 있으므로 시각장애가 나타날 시는 치료를 중지하고 안과학적 검사를 받으십시오.
   4) 천식 관련성, 만성 비염, 부비강염 및/또는 비용종 (nasal polypose), 아스피린 및/또는 비스테로이드성 소염진통제에 의한 알러지 위험이 있는 환자는 천식이 발생할 수 있으므로 주의해서 투여합니다.

5) 이 약은 류마티즘이나 외상 후 자발적인 퇴행 및/또는 허약에는 추천되지 않습니다.
6) 이 약 투여 중 간장애에 해당하는 증상 (식욕부진, 오심, 복통, 구토, 피로, 뇨의 갈변 또는 황달)이 나타난 환자는 주의깊게 감독하고, 간기능 수치가 비정상으로 발전한 환자는 치료를 중단하여야 하며, 이 약의 투여를 다시 시작하지 않습니다.
7) 이 약을 장기간 투여 받는 환자는 간 효소 수치의 비이상적인 증가를 확인할 수 있도록 정기적으로 가능한 신속히 일정한 임상적 검사를 해야 합니다. 간수치가 증가한다면 투약을 중지하고 다시 시작하지 않습니다.

6. 상호작용
1) 이 약은 단백결합을 하는 약과 병용시 특히 주의해야 합니다.
2) 글리벤클라미드, 아세노쿠마롤 (aceno-courmarol), 와.파린, 디곡신, 테오필린, 수산화알루미늄, 수산화마그네슘과 같은 제산제, 시메티딘과 임상적으로 유의한 상호작용이 없습니다.
3) 푸로세미드와 병용시 푸로세미드에 의해 이 약의 분포 용적이 약간 증가하고 소실반감기가 다소 감소하였으나 모두 임상적 유의성이 없었습니다.
4) 간기능 부전 환자는 특히 이 약과 간독성이 큰 약제를 병용한다면 특별한 주의가 필요합니다.
5) 아래와 같은 약물은 이 약과 병용시 고칼륨혈증을 일으키는 경향이 있으므로 주의합니다. : 칼륨염, 칼륨보존성 이뇨제, ACE Ⅱ 저해제, 비스테로이드성 소염진통제, 헤파린 (저분자량 또는 비분리성), 사이클로스포린, 타크로리무스, 트리메토프림
6) 다른 비스테로이드성 소염진통제 (살리실산의 고용량 포함) : 궤양의 위험 및 소화기 출혈 (상승작용)의 위험을 증가시키므로 병용하지 않습니다.
7) 경구항응고제 : 출혈 (비스테로이드성 소염진통제에 의한 위십이지장 점막 공격 및 혈소판 기능 저해)의 위험이 증가하므로 병용하지 않습니다. 병용이 불가피하다면 엄격히 관리 · 감독합니다.
8) 리튬 : 비스테로이드성 소염진통제 (디클로페낙, 케토프로펜, 인도메타신, 페닐부타존, 피록시캄에서 보고됨)와 병용시 리튬의 신배설 감소로 리튬독성이 증가할 수 있으므로 병용하지 않습니다 . 병용이 불가피할 경우 리튬의 혈중 농도를 엄격하게 감독하고, 병용기간 중 및 비스테로이드성 소염진통제 중단 후에 리튬의 용량을 적정합니다.
9) 메토트렉세이트 : 소염제로 인해 메토트렉세이트의 신장 클리어런스가 감소하여 혈액학적 독성이 증가하므로 메토트렉세이트 15 mg/주 이상을 이 약과 병용하지 않습니다. 그 이하로 사용시에도 투약 초기 몇 주간은 매주 혈액도를 측정하고, 고령일수록 신기능 변화가 크므로 주의합니다.
10) 티클로피딘 : 혈소판 응집 저해작용이 증강되어 출혈위험이 증가되므로 병용하지 않습니다. 병용이 불가피할 경우 출혈시간을 포함하여 엄격히 감독합니다.
11) 펜톡시필린 : 출혈위험이 증가한다. 출혈시간을 더 자주 측정하고 임상적 감독을 강화합니다.
12) 이뇨제, ACE 저해제, 안지오텐신 Ⅱ 저해제 : 메수리드에 의한 신장 프로스타글란딘 합성 감소에 의해 사구체 여과가 저하되므로 위 약제에 의해 탈수된 환자에게 급성 신부전을 일으킬 수 있습니다. 또한 안지오텐신 Ⅱ 저해제 및 ACE 저해제의 강압효과를 감소시킵니다. 환자에게 수분을 공급하고 치료 초기에 신기능을 감독합니다.
13) 베타 차단제 (인도메타신으로부터의 일반화) : 비스테로이등성 소염진통제에 의해 혈관확장성 프로스타글란딘이 저해되므로 베타차단제의 강압효과가 감소될 수 있으므로 주의합니다.
14) 사이클로스포린 : 고령으로 가면서 신독성의 위험이 증가될 수 있으므로 주의합니다.
15) 자궁내장치 : 이 약의 사용으로 자궁내장치의 유효성이 감소할 수 있으므로 주의합니다.
16) 혈전용해제 : 출혈의 위험이 증가될 수 있으므로 주의합니다.

7. 임부 · 수유부에 대한 투여
임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 과량투여시 처치
과량투여시 대증적인 조치 (위세척, 수분 및 전해질 평형 유지 · 감독)를 합니다.

9. 기타
1) 이 약은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 운전자 및 기계 조작하는 환자에게 졸림과 현기증을 일으킬 수 있음을 미리 알립니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관

【포장단위】 10, 100, 300, 500, 1000정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-113(S)
설명서 작성년월일 19930111
개정년월일 20030616

인족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2