전 문 의 약 품
119 : 기타의 중추신경용약

SHIN POONG

골격근이완제

오페락신® 정

Orphenadrine · HCl

오페락신 정은 염산올페나드린을 주성분으로 한 골격근 경련 이완제로서, 골격근 경련에 관여하는 여러 Synapse 반사로를 선택적으로 억제하여 근의 이상긴장을 없애주므로, 이차적인 동통을 완화하고 제거해 주는 중추성 근이상긴장 완해제로, 정상적인 근육기능에는 영향을 미치지 않는 제제입니다.
또한 오페락신 정은 부교감신경 차단 작용과 항진전 작용이 입증되어 Parkinson's disease에도 유효하게 사용할 수 있습니다.

【성분·함량】
염산올페나드린(비.피.) ····· 25mg

【성상】 미황색의 원형정제

【효능·효과】
1. 특발성 파킨슨증
2. 기타의 파킨슨증(뇌염후, 동맥경화성)
3. 골격근 연축의 진통

【용법·용량】
성인 : 염산올페나드린으로서 1회 50mg 1일 3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 녹내장 환자
   2) 유문 및 십이지장 폐색 환자
   3) 협착성 소화성 궤양 환자
   4) 전립선 비대 및 방광경부폐쇄 환자
   5) 분문연축(거대식도) 환자
   6) 중증의 근무력증 환자
   7) 이 약에 과민증 환자
   8) 지발성 운동장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 빈맥 환자
   2) 심혈관질환 환자
   3) 간·신장애 환자
3. 부작용
   구갈, 심계항진, 변비, 배뇨장애, 시야몽롱, 산통, 졸음, 안긴장, 구역, 구토 등의 위장관장애, 허약, 두통, 빈맥, 어지러움, 두드러기, 피부질환, 매우 드물게 다행증, 불면, 신경질 등이 나타날 수 있으나 용량을 감소하거나 투여를 중지하면 사라집니다.
4. 일반적 주의
   일부 환자에서 약물의존성이 나타날 수 있으므로 이 약의 투여를 갑자기 중단하지 않습니다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
   임신중 및 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
6. 소아에 대한 투여
   유·소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100, 500, 1000정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-0448
설명서 작성년월일 19940207
개정년월일 20001006

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2