전 문 의 약 품
119 : 기타의 중추신경용약

근 긴장성질환 치료제

칼론® 정

아플로쿠알론

칼론® 정은 척수로부터 상위중추에 걸쳐 광범위한 작용부위를 가진 중추성 근이완제로서 여러 원인으로 인한 뇌 및 척수장해시 주요증상으로 나타나는 근긴장성 경축성 마비를 개선시켜 환자의 재활의지를 높여주는 재활요법제이며, 어깨결림, 목의 뻐근함, 두중감 등의 경견완증후군 및 요통증 등의 일상적인 근긴장상태를 개선시켜 주는 약제입니다.

【성분·함량】 1정중

아플로쿠알론(식품의약품청고시) 20mg

【성　　상】 백색의 원형 당의정입니다.

【효능·효과】

1. 다음 질환으로 인한 근긴장상태의 개선 : 경견완증후군, 요통증
2. 다음 질환으로 인한 경성(痙性)마비 : 뇌혈관장애, 뇌성마비, 경성척수마비, 척수혈관장애, 경부척추증, 후종인대(後從靭帶)골화증, 다발성 경화증, 근위축성 측색경화증, 척수소뇌변성증, 외상후유증(척수손상, 두부외상), 수술후 후유증(뇌·척수종양을 포함), 기타 뇌척수질환

【용법·용량】

성인 : 아플로쿠알론으로서 1회 20mg 1일 3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
   1) 정신신경계 : 때때로 비틀거림, 어지러움, 졸음, 드물게 두통, 두중 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 드물게 구토, 설사, 구갈, 변비, 복부팽만감, 위염 등이 나타날 수 있습니다.
   3) 피부 : 드물게 광선과민증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
   4) 과민증 : 때때로 발진, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
   5) 기타 : 때때로 무력감, 권태감, 드물게 부종, 이명, 빈뇨, 구내염이 나타날 수 있습니다.
2. 일반적 주의
   졸음, 반사운동능력의 저하 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
   2) 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단하십시오.
4. 소아에 대한 투여
   소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.)
5. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【저장방법】 차광기밀용기

【포장단위】 60, 100, 500, 1,000정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-0487
설명서 작성년월일 19950811
개정년월일 20000110

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2