일 반 의 약 품
222 : 진해거담제

호흡기 질환 치료제

로이솔 정

염산 암브록솔

로이솔 정은 폐포상피에서 표면활성물질(Surfactant)의 분비 증가를 유도, 축적된 분비물의 점도를 저하시키는 작용과 아울러 분비물을 용해하는 효소(lysosomal enzyme)의 생성을 촉진하여 배출의 효과를 높여주므로서 치료기간 중 점막의 분비조절 기능을 개선해 주는 급·만성 호흡기 질환 치료제입니다.

【성분·함량】 1정중
염산 암브록솔(식품의약품청고시) 30mg

【성　　상】 백색의 원형 정제

【효능·효과】
1. 주 효능 효과
점액 분비장애로 인한 급·만성 호흡기 질환 : 급·만성 기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성비염

【용법·용량】
성인 : 염산 암브록솔로서 1회 30mg 1일 3회 경구투여합니다. 계속 치료시 1회 30mg 1일 2회 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
중증 신장애 환자
3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위·복부 팽만감, 위·복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있습니다. 극히 드물게 암브록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성 아나필락시스양 반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오
3) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있습니다.
4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있습니다.
4. 상호작용
에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세퓨록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있습니다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
임신중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오(특히, 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 마십시오.).
6. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 10, 100, 500, 1,000정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-096(S)
설명서 작성년월일 19970828
개정년월일 20010126

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2