전문의약품
114 : 해열 · 진통 · 소염제

만성 관절 질환을 위한 소염 · 진통제

아클론정

아세클로페낙

아클론 정은 위장장애를 극소화시킨 소염 · 진통제로, 류마티스 관절염, 비관절성 류마티즘 등 장기 복용을 필요로 하는 각종 만성 관절질환은 물론 통증을 수반하는 각종 질환에 우수한 항염 및 진통효과를 나타낼 뿐만 아니라, 관절연골생성을 촉진하므로 만성 관절질환에 장기적으로 안전하게 복용할 수 있는 제제입니다. 또한 1일 2회 투여로 기존의 제제에 비해 약효가 오래 지속되어 복용하기에 용이합니다.

【성분 · 함량】 1정중
아세클로페낙(비.피.) ····· 100mg

【성상】 백색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】
· 치통, 외상후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측 절개수술후, 분만후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증
· 류마티스양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절주위염

【용법 · 용량】
통상 성인의 경우 1회 1정, 1일 2회(12시간마다) 복용합니다.
단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있습니다.
반드시 정제는 씹어먹지 않도록 합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
2. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 본 제제 또는 같은 계열의 일부 약물(디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자
2) 다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸 살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성비염을 일으킬 수 있는 천식환자

3) 활동성 위십이지장 궤양이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 위장관의 질병이나 과거 위궤양 경험이 있는 환자

2) 심한 간경련, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자

3) 이뇨제를 복용중인 환자

4) 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자

5) 고령자

4. 부작용

일시적으로 경미한 위복부 통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피합니다.

6. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나 환자가 다른 약물 특히 리튬이나 digoxin, 항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의하도록 합니다.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

1) 임산부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

2) 6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않습니다.

8. 과량 투여시의 처치

과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나, 실수로 과량 복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야 하며, 위장관 자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1℃～30℃) 보관

【포장단위】 10, 100, 250, 500정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3－0598

설명서 작성년월일 19991221

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2