전문의약품
114:해열 · 진통 · 소염제

소염 · 진통제

스토펜정

탈니플루메이트

스토펜정의 주성분인 Talniflumate는 기존의 NSAIDs의 문제점이었던 위장장애 등의 부작용을 경감시킨 제제로 통증, 염증, 강직 등의 증상을 제거해주며, 골관절염 등 각종 질환치료에 효과가 있는 소염, 진통제입니다.

【성분 · 함량】 1정중
탈니플루메이트(식품의약품청고시)·····370mg

【성상】 황색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】
1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상후 동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염.

【용법 · 용량】
성인:탈니플루메이트로서 1회 1정(370mg), 1일 3회 경구투여합니다.
중증일 경우에는 1회 2정(740mg)을 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 소화성 궤양 또는 그 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 간장애 환자
   2) 신장애 환자
   3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
4. 부작용
   1) 과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있습니다.
   2) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나

타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하십시오.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
      ① 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능 검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 취하십시오.
      ② 약물요법 이외의 치료법도 고려하십시오.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
      ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오.
      ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기 투여하는 피하십시오.
      ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여하십시오.
   6) 다른 소염진통제와 병용 투여는 피하는 것이 바람직합니다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의하십시오.
6. 상호작용
   쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)과 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.
7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
   1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
   2) 어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세 이하의 어린이에게는 투여하지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 30, 60, 100, 500, 1000정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-020(S)
설명서 작성년월일 19960701
개정년월일 20000818

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2