단백분해 소염 · 효소제

레오다제정

스트렙토키나제 10,000단위
스트렙토도르나제 2,500단위

전 문 의 약 품
395 : 기타의 대사성 의약품 효소제제

레오다제정은 섬유소 융해인자 Streptokinase(SK) 10,000단위와 핵단백 융해인자 Streptodornase (SD) 2,500단위를 포함하는 대사성 효소제제로 염증증상을 효과적으로 완화시켜 줍니다.

【성분 · 함량】 1정 중
스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제(식품의약품청고시) ····· 10mg
(스트렙토키나제로서 10,000단위, 스트렙토도르나제로서 2,500단위)

【성상】 담홍색의 원형 정제입니다.

【효능 · 효과】
수술 및 외상후의 종창의 완화, 호흡기질환에 수반하는 객담 배출곤란, 마취후 객담 배출곤란, 부비강염, 혈전성정맥염

【용법 · 용량】
성인 스트렙토키나제로서 1회 1만~2만 단위를 1일 4회 투여하십시오. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아닙니다. 따라서 목적없이 투여하여서는 안됩니다. 연령 · 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 혈액응고 이상 또는 혈소판 감소증이 있는 환자
   2) 항응고제를 투여하고 있는 환자
2. 부작용
   1) 과민증 : 때때로 발진, 발적 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
   2) 소화기 : 설사 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   3) 혈액 : 때때로 혈액응고시간의 연장, 출혈경향이 나타날 수 있습니다.
   4) 항생물질, 비스테로이드계 소염진통제등과의 병용시 다음과 같은 부작용이 알려져 있습니다.
      ① 쇼크 : 쇼크를 일으키는 수가 있어서 충분한 관찰이 필요하며, 불쾌감, 구내이상감, 거친숨소리, 현기증, 변의, 이명, 발한 등의 이상을 발견하면 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
      ② 간질성폐렴, PIE증후군 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구중다 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군이 발생할 수 있으므로, 이와같은 증상이 발견되면 즉시 투여를 중단하고 부신피질홀몬제의 투여등 적절한 처치를 실시하십시오.

3. 일반적 주의

연용에 의한 항스트렙토키나제가 생산될 수가 있어 효과감소를 야기할 수 있습니다.
또한 항체가 형성됨에 따라 알러지 반응이 일어날 위험성이 증가됩니다.

4. 적용상의 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
2) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 100, 500정

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-051(S)
설명서 작성년월일 20020225

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2