전 문 의 약 품
232 : 소화성궤양용제

위염 · 위궤양 치료제

테나시드 캡슐

위염이나 위궤양의 발병은 위산, 펩신 등에 의한 공격인자와 위점막층의 점액질, 혈류 공급 등 방어인자와의 균형파괴로 유발됩니다. 테나시드캡슐은 수액(樹液)중에 함유되어 조직수복작용을 가지는 Terpene계 물질인 Teprenone성분의 위염 · 위궤양치료제입니다. 테나시드캡슐은 당단백질등 위점액의 합성과 분비를 촉진하여 위점막의 방어기능을 강화시킬 뿐만 아니라 위점액중 중탄산염의 농도를 증가시켜 위산으로부터 위점막을 보호해 줍니다. 또한 NSAIDs등 각종 약제로 인한 점막손상을 방지하고 H. pylori, Stress 등에 의해 생성된 Oxygen free radical로부터 위점막 상해를 방지하는데 매우 효과적인 위장질환 치료제입니다.

【성분 · 함량】 1캡슐 중

테프레논(식약청고시) ····· 50mg

【성상】

백색-미황백색의 과립 및 분말이 든 상반은 회청녹색 하반은 담등색의 불투명한 경질 캡슐제

【작용 및 특징】

1. 테나시드는 위점막세포보호제로서 위점막병변 개선작용으로 위염 · 위궤양에 우수한 치료효과를 나타냅니다.
2. 테나시드는 위산분비억제작용을 갖는 항궤양호르몬인 Secretin의 혈중농도를 상승시킵니다.
3. 테나시드는 위점막세포의 Microsome에서 당지질 중간체의 생합성을 촉진시켜주는 작용기전에 의해 위점액을 구성하는 당단백질, 인지질의 합성 · 분비를 촉진합니다.
4. 테나시드는 Prostaglandin 생합성능과 위점막 혈류량을 증가시킵니다.

【효능 · 효과】

· 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기
· 위궤양

【용법 · 용량】

보통 성인 3캡슐(테프레논으로서 1일 150밀리그람)을 3회 분할 식후에 경구투여 합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구갈, 구역, 복통 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 간장 : 때때로 GOT, GPT치의 가벼운 상승이 일어날 수 있습니다.
   3) 정신신경계 : 드물게 두통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   4) 피부 : 드물게 발진, 전신가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
   5) 기타 : 드물게 총 콜레스테롤치의 상승, 안검의 발적, 열감이 나타날 수 있습니다.
2. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
3. 소아에 대한 투여
   소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 없습니다.)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60, 100, 500, 1000 캡슐

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-69(S)
설명서 작성년월일 20020121
개정년월일 20021215

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2