일반의약품

분류번호:231

인사돌정

옛부터 치아는 오복중의 하나로 꼽아 왔습니다. 그러나 치아 못지 않게 중요한 것이 치아를 감싸고 받쳐 주는 치아지지조직(잇몸, 치조골 등)입니다.
치아지지조직 (齒牙支持組織)질환이 있게 되면 잇몸이 붓고 피가 나며 치아가 들뜨고 흔들리며 심하면 빠지게 됩니다. 또한 구취(口臭)도 있게 되어 불편한 생활을 하게 됩니다.
인사돌은 치아지지조직질환 (風齒)에 사용된 최초의 약물로서 프랑스 신텍스사가 개발한 약입니다.
인사돌은 항생물질이 아니면서도 잇몸의 염증을 감소시켜 줄 뿐 아니라 잇몸을 튼튼하게 하여 주어 세균 감염으로부터 저항할 수 있는 힘도 길러줍니다.
인사돌은 치주 인대를 재생시켜 줄 뿐 아니라 치조골의 흡수를 막아주고 재생을 촉진합니다.
※치조골의 골연화는 조골(造骨)세포와 파골(破骨)세포간의 균형(均衡)이 깨어져서 파골세포가 득세할 때 골조직이 부식(腐蝕)되는 현상으로 이때 인사돌은 조골세포를 활성화(活性化)시켜 줌으로써 골세포의 생성을 촉진하고 치조골의 재생을 도와줍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정중

옥수수 불검화 정량 추출물
(Titrated extract of the *Zea mays L.* unsaponifiable fraction, 식약청고시) ·····35mg
(총 스테롤(β-시토스테롤로서) 7mg)

[성상]

오렌지색의 당의정

[약리작용]

1. 잇몸의 염증을 경감시켜 주며 과잉 염증으로 인한 출혈을 예방하여 줍니다.
2. 치주인대의 섬유를 재생시켜 줌으로써 치아의 흔들림을 막아줍니다.
3. 조골세포를 활성화시켜 주고 치조골을 강화시켜 줌으로써 치조골의 흡수를 막아줍니다.

[특징]

1. 인사돌은 비정상적인 치아의 흔들림을 막아줍니다.
2. 인사돌은 잇몸질환으로 인한 구취를 감소시켜 줍니다.
3. 인사돌은 잇몸의 통증을 경감시켜 주며 치경부위의 감수성을 둔화시켜 줍니다.
4. 국소치료시 인사돌을 병용하면 더욱 높은 치료효과를 기대할 수 있습니다.
5. 인사돌은 내약성이 우수하여 장기간 연용할 때 불편하지 않습니다.

인사돌은 틀니(輔綴)를 할 경우에도 필요합니다.

- 인사돌은 잇몸이 아무는 기간을 단축시켜 주기 때문입니다.
- 인사돌은 잇몸이 훌륭하게 각질화(Keratinization)되도록 도와 주기 때문입니다.
- 인사돌은 치조골 정부(Crests)의 모양을 좋게 고쳐 주기 때문입니다.
- 인사돌은 틀니의 지주(Pillars)를 튼튼하게 하여 줌으로써 훌륭한 보철이 되도록 도와 주기 때문입니다.

[효능 · 효과]
다음 질환에 사용할 수 있습니다.
치주질환〔치아지지조직질환, 치은염, 치주증(유년형 치주염)〕

[용법 · 용량]
성인 : ●초기량으로는 옥수수의 불검화정량추출물로서 1회 70mg(2정) 1일 3회 식전에 경구투여(복용) 하십시오.
●유지량으로는 1회 35mg(1정) 1일 3회 식전에 경구투여(복용) 하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
*식전에 복용하시면 최대의 흡수효과를 볼 수 있으며 4주 정도 초기량(1회 2정, 1일 3회), 이후 유지량(1회 1정, 1일 3회)으로 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 부작용
가벼운 완하작용을 일으킬 수 있습니다.
4. 상호작용
이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있습니다.
5. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

[포장단위] 10, 20, 40, 60, 100, 180, 500정

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품의 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자, 또는 병원 등 유통경로를 통하여 교환해 드립니다.

1077
0704

제조발매원
동국제약주식회사
충청북도 진천군 광혜원면 죽현리 488-5

■ 학술부:(02)2191-9856 ■ 공장:(043)535-0121 ■ 수신자 부담전화:080-777-5678(본사) 080-777-5679(공장)