일반의약품
분류번호:222

급만성기관지염치료제

# 암펙솔정

(염산 암브록솔)

*Ampexol Tab.*

부비강에서부터 말단 세 기관지까지를 호흡기도라 하며 점막층으로 덮혀 있고, 끊임없이 점액질을 분비하여 외부로부터의 각종 세균이나 Virus, 公害로부터 호흡기도를 보호 하고 있습니다.
한편 **암펙솔정**은 표면 활성물질의 生成을 촉진시키고 점액성 분비를 촉진시켜 氣道 자체를 보호하면서 호흡기도의 粘度 높은 축적분비물을 용해하고 배출을 촉진시켜 호흡을 용이하게 하며 기침을 멎게 합니다.
**암펙솔정**은 耐性이 우수하기 때문에 장기치료시도 안심하고 사용할 수 있습니다.

**【원료약품의 분량】** 1정중
염산 암브록솔(식약청고시) ····· 30mg

**【성 상】**
백색의 원형 정제

**【약리작용】**
1. 만성폐쇄성 기관지환자 30명에 4주간 경구 투여하여(45mg/Day) 좋은 결과를 얻었다.
2. 급만성 기관지환자(98명)에 45~95mg/Day씩 4주간 투여하여 기침과 가래와 함께 호흡곤란증이 현저히 감소하였다. 수술 후 기관지염 치료에도 유용하다.
3. 만성폐쇄성 기관지염보다 硅肺症환자에게 더 큰 효과가 있다.

※ Reference:MARTINDALE P.686

**【조 성】**
암펙솔정은 Trans-4-(2-Amino-3, 5-dibromobenzylamino) Cyclohexanol (염산암브록솔)$C_{13}H_{18}Br_2N_2O$=378.1
매정당 30mg의 Ambroxol을 含有한다.

**【효능 · 효과】**
1. 주효능 효과
점액분비장애로 인한 급 · 만성 호흡기질환 : 급 · 만성기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성비염

**【용법 · 용량】**
성인 : 염산암브록솔로서 치료초기에 1회 1정(30mg) 1일 3회 복용한다. 계속 치료시 1회 1정(30mg)씩 1일 2회 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**【포장단위】**
자사포장단위

**【저장방법 및 사용기간】** 기밀용기, 실온보관, 3년

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   중증 신장애 환자
2. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위 · 복부팽만감, 위 · 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
   2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
   3) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
   4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
3. 상호작용
   에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
   임신중 및 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다(특히 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다).
5. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

**화영제약주식회사**
경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 880303
설명서 개정일 030701