

신속하고 강력한 제산제

에디정

(침강탄산칼슘)

EDEE Tab.

에디정은 뛰어난 제산력과 빠른 제산속도를 가지며 약효시간이 긴 이상적인 제산제입니다.

따라서 위산과다(위염, 위궤양, 십이지장궤양), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 신트림 등 위장관 질환의 제증상을 빠르고 신속하게 치료합니다.

또한 **에디정**은 칼슘요구량이 많은 성장기 청소년 및 골밀도가 현격히 감소하는 노인 및 여성 등에 칼슘을 보충하여 골질을 예방할 수 있는 칼슘보급형 위장약입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

침강탄산칼슘(약전) 750mg

【성상】

백색~유백색의 씹어먹는 원형정제

【약리작용 및 특징】

1. **에디정**은 제산효과가 신속하고 강력하며 약효시간이 길어 위장관 질환의 제증상에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
2. **에디정**은 1정당 칼슘 약 300mg을 함유하므로 1일 2~4정을 복용하면 1일 칼슘요구량을 충분히 보충할 수 있어 성장기 청소년, 노인 및 여성 등에 좋은 칼슘보급형 위장약입니다.

【효능·효과】

1. 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
2. 칼슘보급

【용법·용량】

• 성인

1. 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 탄산칼슘으로서 1일 1~5g을 3~4회 분할 경구투여한다.
2. 칼슘보급 : 1일 2~4정(1.5~3g)을 1~2회 분할 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【포장단위】 자사포장단위**【저장방법 및 사용기간】** 기밀용기, 사용기간 : 3년**【사용상의 주의사항】**

1. 경고

1일 최대용량 10정(7.5g)을 초과하지 않도록 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 중증 고칼슘혈증 환자 및 중증 고칼슘뇨증 환자
- 2) 부갑상선기능항진증 또는 갑상선기능저하증 환자
- 3) 중증 신부전 환자
- 4) 무산증 또는 위산 결핍증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장에 환자
 - 2) 심기능장애, 폐기능장애 환자
 - 3) 변비 환자
 - 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
4. 부작용
 - 1) 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 구역, 변비 또는 설사가 나타날 수 있고 드물게 위산의 반동성 분비등이 나타날 수 있다.
 - 2) 대사이상 : 고용량 복용에 의해 고칼슘혈증, 알칼리증이 나타날 수 있다.
 - 3) 장기 대량투여 : 신결석, 요료결석이 나타날 수 있다.
 - 4) 과민증 : 가려움증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에 투여시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
6. 상호작용
 - 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
 - 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 3) 다량의 우유와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 4) 비타민 D, 치아잇게 이노제와 병용투여시 고칼슘혈증이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 940715

설명서 개정일 060701