

위·장 기능 개선제
옥티로늄정
과민성 대장 증후군 치료제
Octylonium Bromide 20mg

OCTYRONUM Tab.

복통, 설사, 변비, 설사와 변비의 교대, 복부 불쾌감, 복부 팽만감 등의 증상은 현대인에게 많이 나타나는 증상들입니다. 이것은 불안, 긴장, 스트레스 등의 심리적 요인과 불규칙하고 섬유질이 적은 식습관, 자극성 기호품의 과다복용, 세균성 장염(이질)감염후, 또는 하제의 상습적 복용 등의 요인에 의해 발생하는 기능적 장질환입니다. 이 증상들을 통틀어 과민성 대장 증후군이라 부릅니다.

옥티로늄정은 위장관의 평활근세포에만 선택적으로 작용하므로써 부작용 없이 이러한 과민성 대장 증후군을 개선시켜줍니다.

【 원료약품의 분량 】 1정중

브롬화옥틸로늄(식약청고시) 20mg

【 성상 】 녹색의 원형정제

【 약리작용 및 특징 】

1. 옥티로늄정은 과민성대장증후군에서 나타나는 위장관의 통증을 신속히 제거시켜주며, 설사, 변비, 설사와 변비의 교대, 복부 불쾌감, 복부 팽만감을 치료합니다.
2. 옥티로늄정은 위장관 경련증및 위장관의 기능저하증에 높은 치료효과를 나타냅니다.
3. 옥티로늄정은 평활근세포에 직접 작용하여 Ca^{++} 유입을 차단하는 항근육성 진경작용을 나타냅니다.
4. 옥티로늄정은 부작용인 구갈, 현기, 서맥, 배뇨장애, 위액분비감소 등의 전신적인 항콜린성 증상을 나타내지 않습니다.

【 효능·효과 】

위장관 경련 및 과민성대장 증후군

【 용법·용량 】

성인 : 브롬화옥틸로늄으로서 1회 20~40mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【 포장단위 】 자사포장단위

【 저장방법 및 사용기간 】 밀폐용기, 실온보관, 사용기간:3년

【 사용상의 주의사항 】

1. 다음 환자에는 투여하지 말것
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
녹내장 환자

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우 에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자 상담실 (031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체