전문
보험용

테라-싸이클린 캅셀

염산테트라사이클린 제제 250mg 1000Cap.

작용 • 특성: 테라싸이클린 캅셀(염산테트라사이클린 제제)은 그람양성균, 그람음성균은 물론 리켓치아, 스피로헤타, 대형바이러스 및 일부 원충류에 이르기까지 넓은 항균효과를 나타냅니다. 테라싸이클린 캅셀은 경구투여후 곧 혈중에 흡수되어 신체 각 조직에 침투되며 요 및 대변을 통하여 활성형으로 배설됩니다.

조성 • 성상: 1. 원료약품의 분량 : 매 캅셀당

염산테트라사이클린(항 · 기) ····· 250mg (역가)

2. 성상: 황색의 결정 또는 결정성 분말이 들어있는 상의는 갈색, 하의는 담회색의 캅셀제입니다.

효능 • 효과: 1. 유효균종

리켓치아, 페럼미코플라스마, 앵무병클라미디아, 재귀열균, 육아종피막성구균, 트라코마 클라미디아, 연성하감균, 콜레라균, 페스트균, 박테로이드속, 브루셀라속, 대장균, 엔테로박터속, 인플루엔자균, 클레브시엘라속, 연쇄구균, 폐렴구균, 황색포도구균, 임균, 매독트레포네마, 단구성리스테리아, 탄저균, 푸조박테륨속, 야토병균

2.적응증 ① 주효능 • 효과

발진티푸스, 발진열, 양충병(쯔쯔가무시병), 큐열, 록키산홍반열, 리켓치아두창, 진드기열, 미코플라스마폐렴, 비둘기병, 앵무병, 서혜육아종, 성병성림프육아종, 재귀열, 연성하감, 콜레라

② 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.

페스트, 야토병, 브루셀라증, 매독, 리스테리아증, 탄저, 여드름, 봉입체결막염, 편도염, 인두염, 후두염, 기관지염, 기관지확장증(감염시), 폐렴, 폐화농증, 유선염, 림프관염, 골수염, 성홍열, 담낭염, 담관염, 외이도염, 중이염, 부비강염, 유양돌기염, 임질, 신우신염, 방광염, 요도염, 자궁내감염, 가스괴저, 와일병, 백일해, 급성누낭염, 치조농양, 뇌농양

용법 • 용량: 성인:염산테트라사이클린으로서 1일 1g(역가)을 4회 분할 경구 투여합니다.

어린이: 1일 체중kg당 25~50mg(역가)을 4회 분할 경구투여합니다. 이 약은 증세가 가라앉고 열이 내린 후에도 24-48시간은 더 투여하여야 합니다. 식품, 유류, 유제품은 이 약의 흡수를 방해하므로 이 약은 식전 1시간 또는 식후 2시간에 투여하여야 하며 유아에게는 수유 1시간전에 투여하여야 합니다. 연쇄구균감염증에는 적어도 10일간 투여를 계속합니다. 신장애 환자는 상용량을 줄이거나 투여시간 간격을 넓혀 총 용량을 줄입니다. 연령 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항: 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

테트라사이클린계 항생물질에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

① 이 약의 장기 또는 반복 단기투여에 의해 임신 후반기, 유유아 8세 이하의 어린이 즉 치아 발육기에 치아의 영구적 변색(황색-회색-갈색)이 일어날 수 있으며 또 치아의 에나멜 형성부전도 보고되어 있으므로 치아발육기에는 다른 항생물질을 사용할 수 없거나 금기로 되어 있을 경우에만 이 약을 투여합니다.

② 신장애 환자는 상용량에서도 약물의 과잉축적이 나타나 간독성을 일으킬 수 있습니다. 이러한 경우 용량을 줄이고 장기투여시에는 약물의 혈청농도를 측정합니다. 이 약의 항동화작용은 BUN을 상승시킵니다. 신장애 환자는 BUN 상승에 의해 질소혈증, 인산염과잉혈증 산증이 나타날 수 있습니다

③ 이 약을 투여할 경우 심한 일광화상을 나타내는 광감수성이 나타날 수 있으므로 직사일광이나 자외선에 노출되는 환자에게는 이러한 사실을 알려주며 피부홍반증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지합니다.

④ 간장애 환자

⑤ 식도통과장애 환자

⑥ 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰합니다.)

3. 부작용 ① 간장:드물게 GOT, GPT의 상승 등이 나타날 수 있습니다.

② 소화기: 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 설염, 구내염, 연하곤란, 소장결장염, 모닐리아의 과잉성장에 의한 항문성기주위염이 나타날 수 있습니다. 드물게 식도염, 식도궤양이 나타날 수 있습니다.

③ 피부: 드물게 반점상구진, 홍반성발진, 박탈성 피부염이 일어날 수 있습니다.

④ 신장: BUN 상승이 나타날 수 있으며 이는 용량과 관계가 있습니다.

⑤ 과민증: 발열, 발진, 두드러기, 혈관신경성부종, 아나필락시스, 아나필락시양 자반, 심막염, 전신성 홍반성 루푸스(SLE)의 악화가 나타날 수 있습니다.

⑥ 혈액:용혈성빈혈, 혈소판감소, 호중구감소, 호산구증가가 나타날 수 있습니다.

⑦ 비타민 결핍증: 드물게 비타민 K결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.

⑧ 장기투여: 장기 투여에 의하여 갑상선에 현미경적 흑갈색 착색이 나타난다는 보고가 있으나 갑상선의 기능 이상은 알려져 있지 않습니다.

⑨ 기타: 성인에서 양성두개내고혈압, 유아에서 천문융기가 나타난다는 보고가 있으나 투여를 중지하면 이러한 증상은 없어집니다. 두통, 시각장애, 시신경원판의 울혈유두 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

4. 일반적 주의 ① 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여합니다.

② 이 약을 장기간 투여할 경우 조혈기관, 신장, 간장 등의 장기의 기능검사를 실시하여야 합니다.

③ 다른 항생물질과 같이 이 약 투여시 진균을 포함하여 이 약에 비감수성인 균의 과잉성장을 초래할 수 있습니다. 이러한 과잉성장이 나타나면 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

5. 상호작용 ① 혈장 프로트롬빈의 활성을 저하시키므로 항응혈제의 치료를 받는 환자는 항응혈제의 용량을 감소시켜야 합니다.

② 이 약은 정균제로서 페니실린과 같은 살균성 항생물질의 작용을 방해하므로 페니실린과 병용투여 하지 않는 것이 바람직합니다.

③ 경구용 피임약과 병용투여 할 경우 경구용 피임약의 효과가 저하되므로 병용투여시 주의합니다.

④ 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 또는 아연, 철제와의 병용투여시 흡수가 저하되고 효과가 감약할 우려가 있습니다.

⑤ 메톡시플루란과 병용투여시 치명적인 신독성이 보고되어 있습니다

⑥ 설포닐요산계 혈당저하약과의 병용에 의해 그 혈당강하 작용이 증가하는 경우가 있습니다.

6. 임부에 대한 투여: 동물실험결과 이 약은 태반을 통과하여 태자조직에서 검출되며 이는 태자골격 형성저하와 같은 태자발육에 유해한 작용을 나타냅니다. 또한 임신초기에 투여된 동물에서 태자독성이 보고되고 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 신중히 투여합니다

7. 수유부에 대한 투여: 테트라사이클린은 모유로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중지하거나 투여를 중지합니다.

8. 신생아에 대한 투여: 이 약은 골격형성조직에서 칼슘과 안정한 착화합물을 형성합니다 이 약을 6시간마다 체중 kg당 25mg(역가)을 투여한 조산아에 있어 비골의 성장율이 저하되었으며 투여중지후 정상화되었다는 보고가 있으므로 신생아에는 신중히 투여합니다.

9. 적용상의 주의: 식도에 정류하여 붕괴되면 드물게 식도 손상을 일으킬 수 있으므로 다량의 물과 함께 복용하며, 취침 직전의 복용 등에는 특히 주의합니다

저장방법: 차광한 기밀용기에 넣어 건냉암소에 보관하십시오

구입시 유효기한이 경과되었거나 변질 변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

유효기한:

제조번호:

8 806023 002470

KGMP (우수의약품제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

L04 ·102595

종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)