탐부톨정

항결핵화학요법제

전문의약품 | 대한약전

염산에탐부톨 400mg

작용·특성 : 1. 결핵균의 대사과정을 차단합니다.
탐부톨은 결핵균의 증식에 필요한 대사과정을 저해하여 항결핵작용을 나타냅니다.
2. 다른 항결핵제와 교차내성이 없습니다.
탐부톨은 다른 항결핵제, 즉 Streptomycin, PAS, Cycloserine, Kanamycin, Ethionamide, Viomycin, Pyrazinamide, Capreomycin등과 교차내성이 없어 이러한 항결핵제에 내성이 있는 균에도 작용을 나타냅니다.
3. 폐조직으로의 침투력이 강력합니다.
탐부톨은 위장관에서 흡수된 후 높은 혈중농도를 유지하고, 폐조직으로의 이행률이 높아 객담에서도 고농도로 나타납니다.
4. 타 항결핵제와 병용 투여할 수 있습니다.
탐부톨을 결핵균의 초회치료에 상용되는 타 항결핵제 즉 Isoniazid (INH)나 Streptomycin, Kanamycin 등과 병용하면 결핵균의 탐부톨에 대한 내성획득이 더욱 지연됩니다.
또한 초회치료시 타 항결핵제에 내성을 나타낸 결핵균의 재치료에는 INH 또는 전에 투여하지 않은 항결핵제와 병용투여 합니다.
특히 탐부톨은 리포덱스와 병용할 경우, 초회치료와 재치료를 막론하고 치료효과를 높일 수 있습니다.
5. 독성이 적고 부작용의 발현이 적습니다.
탐부톨은 독성이 적고, 다른 항결핵제와는 달리 간장장애, 정신장애, 청력장애 등이 나타나지 않으며 위장장애, 시력장애 등과 같은 부작용의 발현율도 낮습니다. 따라서 부작용으로 인해 치료를 중단해야 하는 경우는 거의 없으므로 장기투여에 적합합니다.

조성·성상 : 1. 원료약품의 분량 : 매 정당
염산에탐부톨(B. P.)……400 mg
2. 성 상 : 황색의 제피된 정제입니다.

효능·효과 : 1. 유효균종 : 폐결핵균
2. 적 응 증 : 폐결핵, 기타 결핵증

용법·용량 : 1. 초치료
체중 kg당 15 mg을 1일 1회 투여합니다.
2. 재치료
60일간은 체중 kg당 25 mg을 1일 1회 투여하고 그 후부터는 체중 kg당 15 mg으로 감량하여 1일 1회 투여합니다.

※ 1)타 항결핵제와 병용하여야 합니다.
2)13세 이하의 소아에게는 투여하지 않는 것이 좋습니다.
3)체중 kg당 25 mg을 복용할 때는 월 1회 안검사(眼檢査)를 받아야 합니다.
4)1일 1회 투여합니다.

사용상의 주의사항

1. **다음 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하지만 투여가 불가피할 경우는 신중히 투여합니다.**
   1) 시신경염 환자
   2) 당뇨병 환자, 알코올 중독 환자
   3) 영·유아
2. **다음 환자에는 신중히 투여합니다.**
   신장애 환자
3. **부작용**
   1) 말초 신경계
   - 시신경 : 때로 시신경 장애에 의해 시력저하, 중심암점, 시야협착, 색신이상 등의 시력장애가 나타나므로 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 시는 투여를 중지합니다.
   - 지각신경 : 때로 하지의 마비감이 나타나므로 이러한 증상이 나타날 때는 투여를 중지합니다. 계속 투여가 불가피할 경우 신중히 투여합니다.

   2) 중추신경계 : 환각, 불안, 불면 등의 정신증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 때는 투여를 중지합니다.
   3) 과민증 : 드물게 발열, 발진 등의 과민증상이 나타나므로 이런 증상이 나타날 때는 투여를 중지합니다.
   4) 소화기 : 때로 식욕부진, 구역, 구토, 위부불쾌감, 위통 등의 증상이 나타납니다.
   5) 간장 : 드물게 중증의 간장애, 일과성의 GOT, GPT의 상승 등이 나타날 수 있으므로 정기적으로 간기능 검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   6) 기타 : 드물게 두통, 현기, 권태감, 고뇨산혈증이 나타납니다.
4. **일반적 주의**
   1) 때로 시력장애가 나타나므로 시력검사를 충분히 하고 투여합니다.
   2) 다른 항결핵제와의 병용에 의해 중증의 간장애가 나타날 수 있으므로 병용하는 경우는 정기적으로 간기능 검사를 합니다.
5. **상호작용**
   1) 시력장애는 리팜피신에 의해 증강될 우려가 있으므로 병용할 경우는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여합니다.

2) 다른 항결핵제와 병용할 경우, 중증의 간장애가 일어날 수 있으므로, 정기적으로 간기능 검사를 합니다.

6. **적용상의 주의**

이 약은 황색 4 호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

저 장 방 법 : 기밀용기에 넣어 보관하십시오.

포 장 단 위 : 탐부톨정(400mg)··50, 60(납품용), 100, 500, 600(납품용), 1,000정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품제조 및 품질관리기준) 적격 업소제품

I17 · 013085

종 근 당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)