카멕스® 캅셀

전문의약품
세파드록실 제제

작 용 · 특 성 : **카멕스캅셀**은 그람양성 및 그람음성균에 대해 살균작용을 나타내는 반합성 세팔로스포린계 항생물질로서, penicillinase를 생성하는 포도구균이나 대장균, 기괴변형균 등의 문제세균에도 효과를 발휘합니다.
카멕스캅셀은 경구투여후 신속히 흡수되며 유효혈중농도가 12시간이상 지속되므로 1일 2회 요법으로도 충분한 효과를 나타냅니다. 또한, **카멕스캅셀**은 위산에 안정하여 위내의 음식물존재에 영향을 받지 않고 흡수가 양호하므로 식사의 제한없이 복용할 수 있습니다.
카멕스캅셀은 요로감염증, 호흡기 및 피부감염증 등에 효과적인 경구용 항생제입니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 :** 매 캅셀당
세파드록실(항 · 기) ····· 500mg(역가)
2. 성상 : 내용물이 백색 또는 엷은 백색의 분말이 든 상 · 하가 미황색인 불투명한 캅셀제입니다.

효 능 · 효 과 : **1. 유효균종**
베타용혈성연쇄구균, 포도구균(페니실리네이스생성균 포함), 폐렴구균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라속
2. 적응증
① 주효능 • 효과
신우신염, 방광염, 요도염, 피부 및 피부조직감염증, 인두염, 편도염

용 법 · 용 량 : **성인 :**
- 요로감염증 : 단순성 하부 요로감염증(방광염 등)에는 세파드록실로서 1일 1~2g(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여 합니다. 기타 요로감염증에는 1일 2g(역가)을 2회 분할 경구투여합니다.
- 피부 및 피부조직감염증 : 1일 1g(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여 합니다.
- 인두염, 편도염 : 그룹 에이 베타 용혈성연쇄구균에 의한 인두염, 편도염은 1일 1g(역가)을 1회 또는 2회 분할하여 10일간 경구투여 합니다.

어린이 :
- 요로감염증, 피부 및 피부조직감염증 : 1일 체중 kg당 30mg(역가)을 2회 분할 경구투여 합니다.
- 인두염, 편도염 : 1일 체중 kg당 30mg(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여 합니다. 베타 용혈성 연쇄구균감염증에는 적어도 10일간 복용합니다.

신장애 환자 :
신손상환자의 경우 세파드록실의 용량은 약물축적을 방지하기 위해 크레아티닌 청소율에 의해 조절되어야 합니다. 다음의 투여계획이 추천됩니다.
즉, 성인의 초기용량은 1000mg(역가)이며, 유지량은 크레아티닌청소율(mL/min/1.73㎡)을 기초로 하여 아래의 시간 간격으로 500㎎(역가)입니다.

크레아티닌 청소율	투여간격
0~10mL/min	36시간
10~25mL/min	24시간
25~50mL/min	12시간

크레아티닌 청소율이 분당 50mL이상인 환자들은 정상 신장기능을 가진 환자의 경우와 같이 치료할 수 있습니다.

사 용 상 의 주 의 사 항 : **1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.**
① 이 약에 의하여 쇽의 병력이 있는 환자
② 세팔로스포린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
③ 전염성 단핵증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 사용합니다.
① 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
② 페니실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
③ 본인 또는 부모, 형제에 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
④ 심한 신장애 환자(크레아티닌 청소율이 50mL/min이하인 경우)
⑤ 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰합니다.)
⑥ 위장관질환의 병력이 있는 환자(특히 대장염)

3. 부작용
① 쇽 : 드물게 쇽을 일으킬 수 있으므로 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
② 과민증 : 때때로 발진, 드물게 두드러기, 홍반, 안면부종, 혈관부종, 점막수포, 가려움증, 발열 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
③ 혈액 : 드물게 혈소판감소, 과립구감소, 호산구증가가 나타날 수 있습니다. 다른 세펨계 항생물질투여시 용혈성 빈혈이 나타났다는 보고가 있습니다.
④ 간장 : 드물게 GOT, GPT, AL-P의 상승이 나타날 수 있습니다.
⑤ 신장 : 다른 세펨계 항생물질투여시 드물게 급성 신부전 등의 심한 신장애가 나타났다는 보고가 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
⑥ 소화기 : 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 심한 대장염이 나타날 수 있습니다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 또한 때때로 설사, 구역 드물게 구토, 위통, 복통, 식욕부진, 위부불쾌감 등이 나타날 수 있습니다.
⑦ 호흡기 : 다른 세펨계 항생물질투여시 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 합니다.

⑧ 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있습니다.
⑨ 비타민 결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.
⑩ 기타 : 외음부 가려움증, 외음부 모닐리아증, 질염 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

① 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여합니다.
② 쇽 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진합니다.
③ 만약 과민반응이 발생되면, 투약을 중지하고 보통 적절한 치료제(예 : 에피네프린, 기타 승압아민제, 항히스타민제 또는 코르티코스테로이드)로 처치해야 합니다.

5. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

6. 수유부에 대한 투여

수유부에 투여할 경우에는 주의합니다.

7. 임상 검사치에 대한 영향

① 테스테이프반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의 합니다.
② 직접 쿰스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의합니다.

8. 기타

광감수성이 나타났다는 보고가 있습니다.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온에 보관 하십시오.

포 장 단 위 : 카멕스캅셀(500㎎) ····· 4, 10, 100, 500 캅셀

구입시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

® = 등록상표 I11 · 032587

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

종 근 당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)