애드칼® 정

일반의약품

비타민D 함유 칼슘제제

작 용 · 특 성 : 칼슘(Ca)은 혈액의 응고, 골격근과 심장근육의 수축, 신경전달 및 생체내 각종 반응의 활성화 등에 관여하므로 생명활동에 필수적일 뿐만 아니라 특히 뼈를 형성하는데 가장 중요한 미네랄입니다. 칼슘이 부족되면 골연화증과 허리 및 등의 통증이 나타나며 키가 줄어들고 작은 충격으로도 골절이 되는 골다공증(골조송증)을 일으키기 쉽습니다. 특히, 폐경후 여성에서는 골흡수를 억제하는 호르몬인 에스트로겐의 양이 급격히 감소하여 뼈에서의 칼슘손실이 많아지므로 골다공증의 위험이 더욱 커집니다.

애드칼 정은 흡수가 용이한 젖산칼슘을 비롯한 3가지의 칼슘염과 칼슘의 장관흡수를 촉진하는 비타민D_2가 이상적으로 처방되어 칼슘의 체내 이용율을 높혀주므로 골연화증, 골다공증 등을 예방하고 칼슘결핍증상에 효과적으로 칼슘을 공급할 수 있는 제제입니다.

조 성 · 성 상 : 1. 원료약품의 분량 : 매 정당

젖산칼슘(K.P.) ····· 271.8mg

글루콘산칼슘(K.P.) ····· 240mg

침강탄산칼슘(K.P.) ····· 240mg

(총 칼슘으로서 152.88mg)

건조 에르고칼시페롤(별규) ····· 0.118mg

(에르고칼시페롤로서 100 I.U.)

2. 성상 : 백색 내지 미황색의 장방형 필름코팅 정제입니다.

효 능 · 효 과 : 칼슘결핍 및 기타 칼슘보급을 필요로 하는 경우

용 법 · 용 량 : 일반적으로 취침시 2정을 복용하고, 부족시에는 오전 · 오후 1정씩 복용후 취침시 2정을 복용합니다.

사 용 상 의 주 의 사 항 :

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

① 고칼슘혈증 환자

② 신결석이 있는 환자

③ 중증 신부전 환자

2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.

① 활성형 비타민 D제제를 복용하고 있는 경우

② 강심배당체를 투여중인 환자

3. 부작용

① 소화기계 : 식욕부진, 구역 및 구토, 변비, 위통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

② 기타 : 권태, 고칼슘혈증, 신결석 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

① 장기투여에 의해 혈중 및 요중 칼슘치가 상승할 수 있으므로 장기투여

할 경우에는 정기적으로 혈중 및 요중 칼슘치를 검사하는 것이 바람직하며 고칼슘혈증이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.

② 다음 사람은 사용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 의사의 치료를 받고 있는 사람

③ 복용시에는 다음 사항에 주의하십시오.
- 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시키십시오.

④ 복용중 또는 복용후 다음 사항에 주의하십시오.
- 이 약의 복용에 의해 변비 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

이 약은 테트라싸이클린계 항생제의 흡수를 억제할 수 있으므로 동시에 복용하지 마십시오.

6. 보관상의 주의

① 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

② 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관하십시오.

③ 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 애드칼 정 60, 120, 300, 500정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

® = 등록상표

I12 · 020190

종 근 당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)