종근당 알벤다졸정 400mg

일반의약품

1정 1회 요법 구충제

작용·특성 : 종근당 알벤다졸정은 Albendazole 400mg을 함유한 광범위 구충제로서 회충, 요충, 십이지장충, 편충은 물론 분선충, 아메리카 구충의 단독 또는 혼합감염시에 구충효과를 나타냅니다.
종근당 알벤다졸정은 기생충의 glucose 섭취를 차단하여 에너지를 고갈시키는 기전으로 운동성을 저하시켜 살충효과를 나타내며, 성충 및 유충은 물론 충란까지도 살멸시켜 주므로 기생충의 체내잔존을 막아줍니다.
종근당 알벤다졸정은 1회 복용으로 충분한 구충효과를 나타내므로 2세 이상의 소아및 성인 모두 단 1회, 1정 복용합니다.

조성·성상 : 1. 원료약품의 분량 : 매 정당
알벤다졸 (U. S. P.) ·····400mg
2. 성 상 : 오렌지색의 장방형 필름코팅정

효능·효과 : 다음의 장내 기생충의 구제에 사용합니다.
회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충

용법·용량 :
- 성인및 2세이상의 소아는 아래의 양을 투여합니다.
  1) 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카구충 : 1정(400밀리그람)을 1회 복용합니다.
  2) 분선충 : 1일 1회, 1회 1정(400밀리그람)을 3회 복용합니다.
- 2세이상 소아의 요충증에는 1/2정 (200밀리그람)을 1회 투여하고 7일후 반복 투여합니다.
- 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없습니다.
- 치료 3주후 검사를 하여 구제되지 않았으면 각 기생충의 경우에 따라 2차 투여를 실시합니다.

사용상의 주의사항 : 1. 경 고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2) 2세미만의 유유아
3. 부작용
구토, 속쓰림, 설사등의 위장관장애 또는 두통증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
이약 사용전에는 반드시 임신중이 아님을 확인한 후에 사용하십시오.
5. 수유부에 대한 투여
모유로의 이행은 알려진바 없으나 수유중의 안전성은 확인되지 않았으므로 수유부에게는 투여하지 마십시오.
6. 기 타
드물게 발열, 전신발적, 가려움증이 나타났다는 보고가 있습니다.
7. 1일 허용량제한
아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정 (가능한한 최소량 사용) 합니다.
60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

저장방법 : 밀폐용기에 넣어 실온에 보관하십시오..

포장단위 : 종근당 알벤다졸정 ·····1, 4, 20, 100정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP (우수 의약품 제조및 품질관리기준) 적격업소 제품

I07 · 121093T

종근당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)