

뇌혈관질환치료제

이연 **니모디핀** 정
REYON NIMODIPINE Tabs.

【원료약품의 분량】 1정 (약 339mg)중
니모디핀(법정) 30.0mg

【성 상】 백색 필름코팅 정제

【효능 · 효과】 1. 지주막하출혈후의 뇌혈관경련에 의한 허혈성신경장애의 예방 및 치료
2. 뇌혈관에 기인한 뇌기능장애에 의한 여러 증상(집중력결핍, 기억력감퇴, 우울, 불안)의 개선

【용법 · 용량】

· 성 인

식사와 관계없이 소량의 음료와 함께 씹지 않고 삼킨다.

1. 뇌혈관 경련에 의한 허혈성 신경장애 : 출혈후 5~14일간 니모디핀주사제를 투여한 후 니모디핀정으로서 1회 60mg을 4시간 간격으로 1일 6회 7일간 경구투여한다.
2. 뇌기능장애 : 이 약으로서 1회 30mg 1일 3회 투여한다. 투여간격은 4시간 이상을 유지한다.
경구제와 주사제는 병용투여하지 않는다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
2) 중증의 간기능장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 뇌부종 또는 두개내압이 상승된 환자
2) 간 · 신기능장애 환자 (혈압강하 등의 부작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우 혈압 및 심전도 측정 결과에 따라 투여량을 감소시키는 것이 바람직하다.)
3) 저혈압 환자
3. 부작용
1) 소화기계 : 구역, 위장장애, 드물게 장폐색증이 나타날 수 있다.
2) 중추신경계 : 두통, 어지러움, 무력증, 졸음, 흥분, 발한, 드물게 운동항진, 감정저하, 불면, 초조감 증가, 반항성이 나타날 수 있다.
3) 순환기계 : 혈압강하(저혈압), 안면홍조, 열감, 피부발적, 말초부종, 서맥, 빈맥, 드물게 흉통이 나타날 수 있다.
4) 혈액 : 매우 드물게 혈소판 감소가 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
어지러움이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작에 주의한다.
5. 상호작용
1) 다른 혈압강화제와 병용할 경우 작용을 증강시킬 수 있으므로 주의한다. 다른 칼슘길항제(니페디핀, 딜티아젠텐, 베라파밀 등), 메칠도파 또는 β -차단제와 병용하는 경우에는 혈압을 모니터링하면서 신중히 투여한다.
2) 시메티딘 또는 발프로인산과 병용투여시 이 약의 혈중농도가 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
3) 리팜피신과의 병용에 의해 이 약의 작용이 감약될 수 있으므로 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여한다.
4) 항전간약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀)과 병용투여시 이 약의 생체이용률을 현저히 감소시킨다.
5) 이 약과 자몽(grapefruit)주스를 함께 투여하는 경우에 이 약의 혈중농도가 상승할 수 있으므로 함께 투여하지 않는다.
6) 항우울제 플루옥세틴과 병용투여시 플루옥세틴의 농도는 현저히 감소된다 (단, 그 활성대사체인 노르플루옥세틴은 영향을 받지 않는다.)
7) 항우울제 노르트리프틸린과 병용투여시 노르트리프틸린의 혈중농도와 이 약의 혈중농도가 약간 증가하였다.
8) 신경이완제 할로페리돌을 장기투여하는 환자에게 이 약을 병용 투여했을 경우 상호작용의 가능성을 보이지 않았다.
9) 원소이를 이용한 시험에서 항 HIV약물 지도부딘주와 니모디핀주를 병용투여했을 때 지도부딘의 AUC는 유의하게 높은 반면에 분포용적과 청소율은 유의하게 감소하였다.
6. 수유부에 대한 투여
모유로의 이행이 알려진 바 없으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
중증의 신기능장애 (사구체여과율 < 20mL/min) 또는 중증의 심혈관기능장애를 가진 고령자의 뇌기능장애에 사용한 경우에는 이 약으로 치료 할 지 여부는 신중히 고려해야 하며 정기적으로 추적조사를 하여야 한다.
9. 과량투여시의 처치
1) 과량투여의 증상 : 급성 과량투여시 중독증상은 현저한 혈압강하, 빈맥 또는 서맥, 위장관불쾌감과 CNS증상(예, 구역)이다.
2) 중독의 치료 : 이 약의 급성과량투여시 즉시 투여를 중단하여야 한다. 응급처치는 증상에 따라 행해야 한다. 약물을 경구로 섭취하였다면 응급처치방법으로 활성탄을 투여한 위세척을 하는 것을 고려해야 한다. 혈압이 현저하게 떨어졌다면 도파민 또는 노르아드레날린을 정맥투여 할 수 있다. 특정 해독제가 알려져 있지 않으므로 다른 이상반응의 치료는 가장 현저한 증상에 따라 하여야 한다.

【저 장 방 법】 차광용기, 실온보관

【사 용 기 한】 외포포장을 참조하십시오.

【포 장 단 위】 10, 100, 500정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 변질, 변태 오손된 제품이 발견된 경우에는 즉시 교환하여 드립니다.

제조발매원

이연 제약주식회사

본사: 서울 · 용산구 동빙고동 38-6

공장: 충북 진천군 단산면 한천리 27-27

TEL. (02)793-5557, 5374

개정년월일 2003. 12. 15