

분류번호 349

전문의약품

Sterile Irrigating Solution

옵티코솔 액

Opticosol Solution

【원료약품 및 분량】 100mL 중

염화나트륨(KP)	640mg
염화칼륨(KP)	75mg
염화칼슘(KP)	48mg
염화마그네슘(USP)	30mg
아세트산나트륨수화물(KP)	390mg
시트르산나트륨수화물(KP)	170mg
※ 총 나트륨으로서	357.5mg
총 칼륨으로서	39.3mg
총 칼슘으로서	13mg
총 마그네슘으로서	3.6mg
총 염소이온으로서	453.5mg

【성 상】 무색투명한 액을 무색투명한 유리 또는 폴리염화비닐 용기에 충전한 것

【효능 · 효과】 최대 60분내의 안과영역 수술시 관류액

【용법 · 용량】

이 제제는 수술종류에 따라 정해진 용법에 의해 사용한다. 용기에 따라 공기 주입부가 없으므로 플라스틱 스파이크 내에 공기주입부가 있는 수액 세트를 사용하고 사용되는 특수 수액 세트의 용법에 따른다.
플라스틱 flip-off 캡을 벗겨내고 알코올로 고무마개를 세척, 소독한 후 그 스파이크를 무균적으로 고무 마개의 가운데 부분을 통해 용기에 끼워 넣는다. 약액을 관류하기 전에 공기를 제거한 후 사용한다.

【사용상 주의사항】

- 이상반응
각막 내피에 이상이 있을 때 관류 또는 기타 외상으로 인해 수포성, 염증성 각막질환을 일으킬 수 있다.
- 일반적 주의
각막과 다른 안조직의 손상을 최소화시키기 위해 모든 외과 수술에서처럼 용법 · 용량에 맞게 사용해야 한다.
- 적용상의 주의
 - 이 액은 안과 수술시 관류 용액으로만 사용하고 정맥내 주사용으로는 사용하지 않는다.
 - 이 액은 방부제를 포함하고 있지 않으므로 사용 후 다시 사용할 수 없다. 약액이 혼탁하거나 진공이 되어 있지 않으면 사용하지 않는다.
 - 다른 약품을 첨가하여 사용하면 안내조직에 손상을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 저장상의 주의사항
실온에서 보관하며 지나친 열을 피한다.

【포 장 단 위】 유리용기 : 15, 200, 250, 500mL
폴리염화비닐용기 : 250, 500mL

【저 장 방 법】 밀봉용기, 실온보관(8~27℃)

【사 용 기 한】 제조일로부터 24개월

【제 조 자】 대한약품공업(주) / 경기도 안산시 원시동 736-1

【제조외리자】 이연제약(주) / 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 ezdrug.kfda.go.kr에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드릭 (ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조
- ※ 고객상담실 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 2009. 1. 2



이연제약주식회사

본사 : 서울 · 용산구 동빙고동 38-6
공장 : 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557, 5374