BESTASE

종합 소화효소제

베스타제® 정

1000정

일반의약품

【성분 · 함량】 1정 중

비오디아스타제(Biodiastase) 500(별규) ····· 75mg
- S-아밀라제(S-Amylase) ····· 788U.
- α-아밀라제(α-Amylase) ····· 22,500U.
- 프로테아제(Protease) ····· 53U.

리파제(Lipase) AP_6(별규) ····· 2.8mg
(리파제(Lipase) ····· 168U.)

셀룰라제(Cellulase) AP_3(별규) ····· 25mg
(셀룰라제(Cellulase) ····· 675U.)

제조판매원

東亞製藥(株) 동아제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252

공장 : 충청남도 천안시 차암동 404

인간의 활동력이 되는 칼로리원은 충분한 영양분의 섭취에 있으며 이러한 영양분의 섭취는 건전한 소화기관을 통해서 이루어집니다.

그러나 소화기계통의 이상에 의한 소화효소결핍증이나 외과적수술, 장기요양, 고령 등 각종 원인에 의한 소화력감퇴, 또는 과음 · 과식으로 인한 소화불량에는 소화효소의 보급이 필요하게 됩니다.

베스타제 당의정은 효소의 보고로서 체내에서 분비되는 소화효소군과 동일한 조성을 가지고 있으며 삼대영양소인 탄수화물, 단백질, 지방을 완전히 소화시키는 종합 소화효소제입니다.

베스타제 당의정은 또한 우리 인체에서는 분비되지 않는 식물 섬유 분해효소를 함유하고 있어 야채와 곡물을 많이 먹는 우리 식생활에 가장 적합하며 항상 복용하면 소화작용뿐 아니라 식욕을 증진시키고 또 소화효소 분비기관의 기능을 도와서 영양촉진, 체력증강을 기대할 수 있는 종합 소화효소제입니다.

【성상】 본제는 담 등~ 적갈색의 정제입니다.

【약리작용 · 특징】

• **비오디아스타제 500 :** 소화효소 기원으로 가장 우수한 아스펠길루스(Aspergillus)속의 사상균을 본사의 독특한 제조방법에 의해 배양 · 정제한 것으로 음식물 중의 탄수화물(전분 · 당류 · 섬유 등), 단백질, 지방을 소화하는 30여종의 효소작용을 가지고 있으며 산 · 알카리 영역에서도 다같이 우수한 소화작용을 나타냅니다.

【효능 · 효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감.

【용법 · 용량】

성인 : 1회 2정

소아 : 1회 11~14세 : 1~2정, 8~10세 : 1정

1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
   3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
3. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게 투여하지 마십시오.
4. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

8 806011 010135

HDPE

분리배출

캡 : LDPE

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

® 등록상표

【포장단위】 30정, 100정, 500정, 1000정

주의-부작용

※ 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환해 드립니다.
[문의전화 : (02)920-8264]

제조번호 :

사용기한 :

BST-3K016

작성년월일 : 1991. 10.

개정년월일 : 2003. 10.