

YU RINLAXER 250mg

Chlorphenesin Carbamate

성분 · 함량 1정 중
 카르바민산클로르페네신(약전) 250mg
성상 백색의 원형정제
효능 · 효과
 근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 변형성척추증, 추간판ヘルニア, 척추분리 · 전위증, 척추골다공증, 경견완증후군
용법 · 용량
 성인 : 카르바민산클로르페네신으로서 1회 250mg(1정), 1일 3회 경구투여 합니다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.
사용상의 주의사항
 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 1) 이 약 및 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
 2) 간장애 환자
 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 1) 간장애의 병력이 있는 환자
 2) 신장애 환자
 3. 이상반응
 1) 과민증 : 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통, 두중감, 무력, 권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 합니다.
 3) 소화기계 : 때때로 구역 · 구기, 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 4) 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다.

제 조 원

yuyu (주) 유유

서울사무소 : 100-828 서울시 중구 신당동 358-9번지 유유빌딩
 본사 · 공장 : 430-804 경기도 안양시 만안구 석수동 212
 www.yuyu.co.kr

Under Agreement with
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.



YU RINLAXER

유티락사® 250mg 정

(카르바민산클로르페네신)

골격근이완제

250mg

500정

전문의약품

yuyu

4. 일반적 주의

- 1) 졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 2) 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어 있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능 검사 등)를 하는 것이 바람직합니다.

5. 상호작용

다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여합니다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경 억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여합니다.
- 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

7. 소아에 대한 투여

유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 10, 100, 500, 1000정

본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2005년 11월 10일) 이후 변경된 내용의 확인은 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자 요금부담) 080-900-0066으로 하시기 바랍니다.

제조번호 :

사용기한 :

