

트렌타딜 정 500정

전문의약품

분류번호 : 222

● 원료약품의 분량 1정중 : 염산바미필린(별규)300mg

● 성상 : 백색의 원형필름코팅정

● 효능·효과

1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.

다음 질환의 기도 폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화 :

기관지천식, 만성기관지염

● 용법·용량

성인:염산바미필린으로서 1회 600~900mg 1일 2회(아침, 저녁) 식후에 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

TRENTADIL Tab. 500T (Bamifylline HCl)

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오 1)급성 심근경색 환자 2)크산틴류에 과민증 환자 3)임부
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오 1)심부전 환자 2)갑상선기능항진증 환자 3)간기능부전 환자(필요한 경우 감량한다.) 4)소화성 궤양 환자 5)소아(특히 영아), 고령자 6)다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용 : 때때로 두통, 위통 등이 나타날 수 있다. 또한 과량투여로 구역, 복부팽만감, 산통, 말초부위의 진전 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의 : 테오필린의 경우 대표적인 부작용으로 소화기증상(특히 구역, 구토) 및 정신신경증상(두통, 불면, 불안, 흥분, 경련 등)이 나타날 수 있고 이러한 부작용은 대부분 혈중농도의 상승에 의한 것으로 알려져 있으므로 이 약의 투여시에는 혈중농도의 모니터를 적절히 하고 환자 개개인에 적합한 투여계획을 설정하는 것이 바람직합니다.
5. 상호작용 1)트롤레안도마이신과 병용투여하지 마십시오 2)에리스로마이신, 시메티딘 등과 병용투여시 상승작용이 있습니다. 3)조사마이신은 테오필린의 약동학 변수에 영향을 미치지 않습니다.
6. 소아에 대한 투여 : 소아(특히 영아)는 크산틴류에 민감하므로 신중히 투여하십시오

● 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.



8 806107 306470

작성년월일 : 2000. 07. 21

개정년월일 : 2006. 11. 23



청계제약(주)

경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4
소비자 상담실 : 02-554-2639
홈페이지 : www.chunggeil.co.kr



제조번호:

사용기한: