〔항생물질〕
〔전문의약품〕
〔대한약전품〕

트리세프 250mg 캅셀 500mg

(Cephradine)

트리세프는 반합성 cephalosporin계 항생물질로서 증식기에 있는 균의 세포벽 형성을 저해하여 살균작용을 발휘하며, 또한 빨리 혈중에 흡수되고 변화되지 않은 채 활성형태로 뇨중에 배설되므로 종래의 cephalosporin계보다 더욱 광범위한 항균작용을 가집니다. 아울러 트리세프는 광범위한 임상결과, 부작용의 발현이 낮으며, 신독성이 적어 신장애환자에게도 투여가 가능한 안전한 제제임이 입증되었습니다.

【성분 · 함량】 1캅셀중
세프라딘(항기) ····· 250, 500 mg(역가)

【성상】
- 500mg : 백색 또는 미황색의 결정성 분말이 들어있는 상 · 하 청색 캅셀
- 250mg : 백색 또는 미황색의 결정성 분말이 들어있는 상 – 적자색, 하 – 회색의 캅셀

【효능 · 효과】
1. 유효균종
   포도구균, 폐렴구균, 인플루엔자균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라속, 연쇄구균
2. 적응증
   주효능 · 효과 :
   편도염, 인두염, 대엽성 폐렴, 기관지염, 전립선염, 방광염, 신우신염, 요도염, 농양, 봉소염, 부스럼증, 농가진, 중이염

【용법 · 용량】
1. 성인
   1) 피부 및 연조직, 호흡기 감염증(대엽성 폐렴 제외) : 세프라딘으로서 1회 250mg(역가) 1일 4회 또는 1회 500mg(역가) 1일 2회 경구투여한다.
   2) 단일 요로감염증 : 1회 500mg(역가) 1일 2회 투여한다.
   3) 심한 요로감염증(전립선염포함) 및 대엽성폐렴 : 1회 500mg(역가) 1일 4회 또는 1회 1g(역가) 1일 2회 투여할 수 있다.
2. 어린이
   1) 9개월 이하의 유아에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
   2) 9개월 이상의 유아 및 어린이 : 1일 체중 kg당 25~50mg(역가)을 2~4회 분할 경구투여한다.
   인플루엔자균에 의한 중이염의 경우에는 1일 체중 kg당 75~100mg(역가)을 2~4회 분할 투여한다.
   다만, 1일 4g(역가)을 초과하여 투여하지 않으며 성인량을 초과해서는 안된다.
3. 신장애 환자
   1) 혈액투석을 실시하지 않는 경우 다음과 같이 투여한다.

크레아티닌 청소율	1회량	투여간격
〉20ml / 분	500mg	6시간
5~20ml / 분	250mg	6시간
〈5ml / 분	250mg	12시간

   2) 만성, 간헐, 혈액투석을 실시하는 경우 혈액투석을 시작할 때 초회량 250mg(역가)을 투여하고 12시간 후, 36~48시간 후 각각 250mg(역가)을 투여한다.
   연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   이 약에 의하여 쇽의 병력이 있는 환자.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 이 약 또는 세펨계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
   2) 페니실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
   3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자
   4) 심한 신장애 환자
   5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
3. 부작용
   1) 쇽 : 쇽을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 현기, 변의, 이명, 발한 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
   2) 과민증 : 발진, 두드러기, 홍반, 가려움증, 발열, 림프절종창, 부종, 관절통 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 드물게 리엘증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있다.
   3) 혈액 : 드물게 과립구감소, 호산구증가, 빈혈, 용혈성빈혈, 혈소판감소, 일시적인 백혈구 감소, 호중구 감소가 나타날 수 있다.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT, AL-P의 상승이 나타날 수 있다.
   5) 신장 : 드물게 급성신부전 등의 심한 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
   6) 소화기 : 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 심한 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 구역, 구토, 가슴쓰림, 설사, 위통, 복통, 식욕부진, 위부불쾌감, 드물게 변비, 복부팽만감이 나타날 수 있다.
   7) 호흡기 : 드물게 발열, 천식, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PIE증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 한다.
   8) 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.
   9) 비타민결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.
   10) 기타 : 드물게 두통, 현기, 전신권태감, 상복부불쾌감, 설염, 착감각이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
   2) 쇽 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응시험을 실시하는 것이 바람직하다.
   3) 쇽 발생에 대비하여 구급처치준비를 해두고 투여후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.
5. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
   모유로의 소량이행이 보고되어 있으므로 수유부에 투여할 경우 주의한다.
7. 임상검사치에 대한 영향
   1) 테스테이프반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에 위 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
   2) 직접 쿰스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

【저장방법】
- 250mg : 기밀용기
- 500mg : 기밀용기, 실온보관

【유효기간】
- 250mg, 500mg : 24개월

【포장단위】
- 250mg : 10, 100, 500캅셀
- 500mg : 30, 50, 100, 500캅셀

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 유효기한 · 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품 등은 약국등의 개설자를 통하여 본사 영업부(전화 : 454-4231/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ http : // www.kukjepharm.co.kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 초지동 648번지

개정일 : KJ235990723