[일반의약품]

비스테로이드성 소염 · 진통제

바로론정

(클로낙신리지네이트)

바로론정은 비스테로이드성 소염진통제로 체내에서 동통, 발열, 염증을 유발시키는 물질인 prostaglandin의 생합성을 억제하여 진통, 소염효과를 발휘합니다.
약물학적, 임상적으로 통증의 종류나 강도에 관계없이 강력한 효과를 발휘하게 되며, 특히 치통, 생리통, 신경통, 근육통, 외상 후, 수술 후 통증에 좋습니다.

【성분 · 함량】 1정중
클로낙신리지네이트(식약청고시) ····· 125mg

【성상】 무미, 무취의 백색 원형제피정

【특장】
1. 강력한 진통, 소염, 해열 효과
   진통, 소염, 해열 효과가 강력하고 신속해서, 특히 치통, 생리통등에 유효합니다.
2. 적은 위장장애
   체내에서 위궤양 유발물질을 생성하는 효소(5-LO)의 작용을 차단하기 때문에 위장장애를 줄여줍니다.
3. 우수한 안전성
   내약성이 좋고 안전역이 넓습니다.

【효능 · 효과】
다음 질환에 사용할 수 있습니다.
류마티양 관절염, 근육통, 신경통, 외상후 · 수술후 동통, 두통, 치통, 이통, 월경통

【용법 · 용량】
성인 : 클로낙신리지네이트로서 1회 125~250mg, 1일 3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 소화성궤양 환자
   2) 이 약에 과민증 환자
   3) 임부
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   소화성궤양의 병력이 있는 환자
4. 부작용
   1) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
   2) 기타 : 때때로 구역, 현기증, 졸음, 두통, 식은땀, 한기, 다행증이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의합니다.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다.
      (1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 합니다.
      (2) 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다.
      (1) 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여합니다.
      (2) 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피합니다.
      (3) 원인요법이 있으면 그것을 실시합니다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의합니다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여합니다.
   6) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직합니다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의합니다.
6. 상호작용
   이 약은 혈액응고에 영향을 주지 않으므로 혈액응고와 관련한 용량조절은 필요하지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기

【사용기간】 5년

【포장단위】 10, 100, 500, 1000정

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사 영업부(전화 : 454-4231/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ http : //www.kukjepharm.co.kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 초지동 648번지

작성일 : KJ243910624
개정일 : KJ243990828