

※ 2002년 7월 1일부터 제조물책임법이 시행되고 있습니다.

※ 부작용을 예방하고 올바른 약물복용을 위해 복용전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 복용 전 반드시 설명서를 주의깊게 읽으십시오.
2. 정해진 용법과 용량을 준수하십시오.
(이 약을 장기간 복용할 때는 반드시 의사나 약사와 상담하십시오.)
3. 다른 약물과 함께 복용할 때는 미리 의사나 약사와 상담하십시오.
4. 어린이는 반드시 보호자의 지도감독하에 복용시키십시오.
5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6. 습기와 열원(직사광선등)을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

(일반의약품)

위·장관 기능조절제

타라부틴 200mg
정 100mg

(말레인산트리메부틴)

타라부틴정은 소화관 내부의 신경계에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 위장관 기능을 정상수준으로 조절하는 양면적 작용으로 소화불량과 기능적결장질환에 치료효과를 나타내는 위장관 기능 조절제입니다.

중래의 소화기 질환 치료제는 항콜린제로서 위액분비감소, 구갈, 산동, 시야장애, 서맥, 배뇨장애 등의 부작용을 나타내기 때문에 투여에 신중을 기해야 했으나 타라부틴정은 이러한 부작용이 크게 감소된 위장관 기능 조절제입니다.

【성분·함량】 이 약 1정 중

말레인산트리메부틴(식약청고시) 100mg, 200mg

【성상】 100mg, 200mg 정 - 백색의 원형정제

【약리작용 및 특징】

1. 위·장관운동의 양면조절작용

소화관 내부의 신경계(Meissner's, Auerbach's 신경총)에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 기능을 조절하는 양면 작용으로 기능적 소화불량 및 과민성대장증후군에 효과가 있습니다.

2. 선택적인 장 운동

타라부틴은 소화관의 비정상적인 운동에만 관여하여 위·십이지장계와 또는 각종 소화기 질환에 나타나는 식전의 이상운동을 억제하므로 이들 환자의 통증에 효과적이며 정상적인 운동에는 영향을 미치지 않습니다.

3. 연동운동 촉진작용

연동수축파를 부활 강화시켜 위·십이지장의 연동운동을 촉진시키므로 구토, 오심 등을 개선시켜 줍니다.

4. 진경작용

파파베린의 10배나 강한 진경작용이 있습니다.

5. 국소마취 작용

리도카인과 동등한 국소마취력을 갖고 있으므로 위의 경련, 통증 등을 해소시켜줍니다.

6. 위장병 환자에게 사용효과가 좋으며 유·소아 및 노인에게도 투여가 가능합니다.

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요 자극, 수면장애

【용법·용량】

성인 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내피부염 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이투여시는 수유를 중지하십시오.

【저장방법】 기밀용기

【사용기간】 · 100mg 4년 · 200mg 3년

【포장단위】 100mg, 200mg 정 각각 30, 50, 100, 500, 1000정

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 의약품등은 약국등의 개설자를 통하여 본사영업부(TEL : 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부 (TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

※ <http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다



국제약품공업주식회사

경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 1995년 3월 9일

개정일 : 2002년 1월 10일

01. 2. 12