

※ 2002년 7월 1일부터 제조를 책임법이 시행되고 있습니다.

※ 의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약물사용을 위해 약물사용전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기전 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약지도 합니다.
2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.
3. 습기와 열원(직사광선등)을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 080-022-2200

(항생물질)

(전문약품)

(대한약전품)

트리세프® (Cephadrine)

250mg

캡슐 500mg

트리세프® 캡슐은 반합성 cephalosporin계 항생물질로서 중식기에 있는 균의 세포벽 형성을 저해하여 살균작용을 발휘하며, 또한 빨리 혈중에 흡수되고 변화되지 않은 채 활성형태로 노중에 배설되므로 종래의 cephalosporin계보다 더욱 광범위한 항균작용을 가집니다. 아울러 트리세프® 캡슐은 광범위한 임상결과, 부작용의 발현이 낮으며, 신독성이 적어 신장애환자에게도 투여가 가능한 제제임이 입증되었습니다.

[성분·함량] 이 약 1캡슐 중

세프라딘(약전) 250, 500mg(약가)

[성상]

- 500mg 백색 또는 미황색의 결정성 분말이 들어있는 상·하 청색 캡슐
- 250mg 백색 또는 미황색의 결정성 분말이 들어있는 상·적자색, 하·회색의 캡슐

[효능·효과]

1. 유효균종
 - 포도구균, 폐렴연쇄구균, 인플루엔자균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라, 연쇄구균
2. 적응증
 - 편도염, 인두염, 대염성패렴, 기관지염
 - 방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염
 - 농양, 연조직염, 종기, 농가진
 - 중이염

[용법·용량]

1. 성인
 - 1) 피부 및 연조직, 호흡기 감염증 세프라딘으로서 중증도에 따라 1회 250mg~500mg(약가) 1일 4회 또는 500mg~1g(약가) 1일 2회 투여합니다.
 - 2) 오로감염증 단일 오로감염증에는 1회 500mg(약가) 1일 2회 투여하고, 중증 오로감염증의 경우는 1회 500mg(약가) 1일 4회 투여 또는 1회 1g(약가)씩 1일 2회 투여합니다. 또한 중증 감염의 경우는 치료기간의 연장 및 집중적인 치료가 필요합니다.
2. 소아 1일 체중 kg당 25~50mg(약가)을 2~4회 분할 투여합니다. 중이염의 경우에는 1일 체중 kg당 75~100mg(약가)을 2~4회 분할 투여합니다. 다만, 1일 4g(약가)을 초과하여 투여하지 않으며 성인량을 초과해서는 안됩니다. 9개월 이하의 유아에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
3. 신장애 환자
 - 1) 혈액투석을 실시하지 않는 경우 다음과 같이 투여합니다.

크레아티닌 청소율(mL/min)	1회용량(mg)	투여간격(시간)
> 20	500	6~12
15~20	250	12~24
10~14	250	24~40
5~9	250	40~50
< 5	250	50~70

- 2) 만성, 간질, 혈액투석을 실시하는 경우 혈액투석을 시작할 때 초회량 250mg(약가)을 투여하고 6~12시간 후, 36~48시간 후 각각 250mg(약가)을 투여합니다. 그리고 다음 혈액 투석시에 250mg을 투여합니다. (다만, 최근에 투여한 약물과의 간격이 30시간 이상 된 경우에 한합니다.)

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약에 의하여 속의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 이 약 또는 세르게 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나, 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
 - 2) 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질의 환자
 - 4) 중증의 신장애 환자
 - 5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비강구영양환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰합니다.)
3. 이상반응
 - 1) 속 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 2) 과민반응 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프절종창, 부종, 관절통 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 3) 소화기계 드물게 위막성대장염 등의 합병을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있습니다.
 - 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 함

- 니다 또한 구역, 구토, 가슴쓰림, 설사, 위통, 복통, 식욕부진, 위부불쾌감, 드물게 변비, 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.
- 4) 호흡기계 : 드물게 발열, 천식, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐렴 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 합니다.
 - 5) 혈액계 : 드물게 과립구 감소, 호산구 증가, 빈혈, 용혈성 빈혈, 혈소판 감소, 일시적인 백혈구 감소, 호중구 감소가 나타날 수 있습니다.
 - 6) 피부 : 다른 세포로스포린계 항생물질처럼 다형홍반, 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군이 드물게 나타날 수 있다는 보고가 있습니다.
 - 7) 간장 : 드물게 AST, ALT, ALP의 상승이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 일시적 간염 및 담즙 울체성 황달이 보고되었습니다.
 - 8) 신장 : 드물게 급성 신부전 등의 중증의 신장장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 9) 근교대증 : 드물게 근내염, 칸디다증이 나타날 수 있습니다.
 - 10) 비태민결핍증 : 드물게 비태민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비태민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있습니다.
 - 11) 기타 : 드물게 두통, 전신관태감, 상복부불쾌감, 설염, 착각각이 나타날 수 있습니다.
- 4 일반적 주의
- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
 - 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응시험을 실시하는 것이 바람직합니다.
 - 3) 속 발생에 대비하여 구급처치준비를 해두고 투여 후에도 한지를 안정한 상태에서 충분히 관찰합니다.
- 5 상호작용
- 푸로세미드 등의 이뇨제나 아미노글리코사이드계 항생물질과 병용투여 시 신장장애가 증가할 수 있으므로 신중히 투여합니다.
- 6 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부에는 신중히 투여합니다.
- 7 소아에 대한 투여
- 1) 미숙아와 신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.
 - 2) 9개월 이하의 유아에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 8 고령자에 대한 투여
- 고령자인 경우에는 다음과 같은 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여합니다.
- 1) 고령자는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발현하기 쉽습니다.
 - 2) 고령자에서는 비태민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있습니다.
- 9 임상검사치에 대한 영향
- 1) 타스테아프반응을 제외한 베네딕트식약, 펠링식약, 클리니테스트에 의한 요당검사에 위양성이 나타날 수 있으므로 주의합니다.
 - 2) 직접 쿨스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의합니다.

【저장방법】 • 250mg 기밀용기 • 500mg 기밀용기, 실온보관

【유효기간】 • 250mg, 500mg 24개월

【포장단위】 • 250mg 10, 30, 100, 500캡슐 • 500mg 30, 50, 100, 500캡슐

- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
 ※ 사용기간·유효기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품등은 약국등의 개설지를 통하여 분사영업부(TEL : 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
 ※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
 ※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 분사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
 ※ <http://www.kukjepharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다



국제약품공업주식회사

경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 1999년 7월 23일

개정일 2004년 12월 31일