〔전문의약품〕

항히스타민제

국제 로라타딘 정

국제로라타딘정은 혈액-뇌관문을 통과하지 않아 진정, 졸음과 같은 부작용이 적고, 말초 H1-수용체에 선택적으로 길항작용을 나타내는 삼환계(tricyclic) 항히스타민제로 알레르기성 비염, 알레르기성 피부 질환에 지속적인 효과를 나타냅니다.

【성분 · 함량】 1정중
로라타딘(별규) ·····10mg

【성 상】 백색의 원형 정제

【효능 · 효과】
알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움증, 눈의 작열감), 만성 특발성 두드러기

【용법 · 용량】
- 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg
- 6~12세 미만의 소아
  - 체중 30kg 이상 : 1일 1회 10mg
  - 체중 30kg 이하 : 1일 1회 5mg

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 6세 미만의 소아
2. 다음 환자는 신중히 투여하십시오.
   간장애 또는 신부전 환자
3. 부작용
   이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고되었습니다. 그 밖에 탈모증, 아나필락시스, 간기능장애, 상실성 부정 빈맥 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 4일전에는 투여하지 말아야 합니다.
5. 상호작용
   이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용 투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중농도를 상승시킬 수 있습니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.
   2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않습니다.
7. 과량투여시의 처치
   과량을 투여했을 때는 즉시 대증요법과 지지요법을 시작해야 합니다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 합니다.(토근을 이용하는 방법이 우선적으로 사용됩니다.) 그러나 의식 장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안됩니다. 구토후에 활성탄과 물을 희석하여 투여할 수도 있습니다. 만약 구토가 성공적이지 못하거나 금기사항일 경우는 위세척을 실시해야 합니다. 이 약은 투석으로는 제거되지 않습니다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 합니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【사용기간】 36개월

【포장단위】 100, 500정

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 유효기한 · 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사영업부(TEL 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ http ://www.kukjepharm.co.kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
KUKJE
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 1998년 3월 3일