〔전문의약품〕

평활근 운동조절제 · 진경제

프로파정

(염산티로프라미드)

프로파정은 평활근 세포내의 c-AMP의 양을 증가시키고, 과잉의 Ca^{+2}을 근질세망계(sarcoplasmic reticulum)에 저장하여 평활근 수축의 원인인자를 제거합니다. 위장관을 포함한 평활근의 과도한 운동을 억제하며 통증을 완화시킬 뿐 아니라 평활근 운동의 저하된 상태를 활성화하여, 위장관 및 평활근 운동의 정상화에 기여합니다. 프로파정은 기존의 항콜린성 진경제에 비해 부작용이 적은 약물입니다.

【성분 · 함량】 이 약 1정중
염산티로프라미드(별규) ····· 100mg

【성 상】 백색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】
1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통
   간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장 · 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통
   위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법 · 용량】
성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg을 1일 2~3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
   2) 거대 결장, 허탈 환자
   3) 이 약에 과민증 환자
   4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   항콜린 작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여하십시오.
3. 부작용
   1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
4. 상호작용
   혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.
5. 임부에 대한 투여
   동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.

【저장방법】 기밀용기

【사용기간】 60 개월

【포장단위】 10, 100, 500 정

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 유효기한 · 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자를 통하여 본사영업부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL. 031-781-9081/9)또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ http : //www.kukjepharm.co.kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 2000년 1월 20일