

비마약성 진해제

일반의약품

 코프렐[®]정 20mg (인산벤프로페린)

Cofrel[®] Tablets 20mg (benproperine phosphate)

진해제

Benproperine 의 화학명칭은 1-[2-(2-benzylphenoxy)-1-methylethyl] piperidine 으로서, 화학구조는 C₂₁H₂₇NO 이며, 분자량은 309.43 입니다.

Benproperine phosphate 는 백색의 결정성 물질로 물, 에탄올, 메탄올, 아세트산에 용해되며, 에틸아세테이트, 순수 알코올, 에테르에는 적게 용해됩니다.

<원료약품의 분량>

1 정 중 인산 벤프로페린(식약청고시) 26.4 mg(벤프로페린으로서 20mg 에 해당량)을 함유

<성상>

흰색의 원형 필름코팅정

<작 용>

코프렐은 동물시험에서 기침억제력이 코데인에 비하여 2-4 배 강력합니다. 이는 폐 및 흉막에 있는 수용체로부터 발생하는 구심성 지각신경 임펄스를 차단하여 말초적인 작용을 합니다. 또한 기침중추를 직접 억제하는 작용을 갖고 있습니다. 코프렐의 작용기전은 코데인과 달라서 호흡을 억제하지 않습니다. 코프렐의 평활근에 대한 효과는 진경제인 Papaverine 과 같은 효과를 갖고 있습니다. 인체에 있어서 심이지장 및 담관의 경축 혹은 수축 및 변비의 원인이 되지 않으며 습관성 및 탐닉성이 관찰된 바 없습니다.

<효능·효과>

주요효능·효과

다음 질환에서의 기침: 감기, 급·만성 기관지염, 상기도염 (인·후두염), 폐결핵

<용법·용량>

성인: 벤프로페린으로서 1 회 20-40 mg 1 일 3 회 경구투여 합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감할 수 있습니다.

<사용상의 주의사항>

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 부작용

- 1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 피로, 불쾌감 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 구갈 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하여야 합니다.

3. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위

험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

4. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하여야 합니다.

5. 적용상의 주의

정제를 구강내에서 씹으면 구강점막에 마취 효과를 나타낼 수 있으므로 그대로 삼켜야 합니다.

<교 환>

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.

[포장단위]

20mg x 100 정, 20mg x 500 정

[저장방법 및 사용기간]

저장방법: 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

사용기간: 제조일로부터 36 개월

설명서작성년월일: 2006.01.03

설명서개정년월일: 2009.11.07

K0910

<가장 최근 개정된 제품설명서의 내용은 당사 홈페이지 (www.pfizer.co.kr)를 통해 확인하실

수 있습니다.>

제 조 원

Pfizer Pharmaceuticals Ltd.

22 Daqing Road, Economic_Technical Development Zone, Dalian, Liaoning, China

화이자 중국

수입 판매원

한국화이자제약(주)

서울시 중구 회현동 3 가 1-11 번지

** 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해 보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.*

전화번호(대표) 02-317-2114

(수신자부담) 080-022-1400