

전문의약품

 디푸루칸<sup>®</sup> 정맥주사 100 mg (플루코나졸)

**Diflucan<sup>®</sup> IV 100 mg (fluconazole)**

**<원료약품의 분량>**

매 바이알 (50 ml)당 플루코나졸 (식약청 고시 제 1998-127 호) 100 mg

용제 : 주사용수

**<성 상>**

무색투명한 바이알에 담겨 있는 무색투명한 액체

**<효능 및 효과>**

1. 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강인두, 식도, 비침습성 기관지 폐 감염과 칸디다뇨증, 피부점막 및 만성 위축성 구강 칸디다증 (의치로 인한 구강내 통증) 등을 포함한 점막 칸디다증.
2. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신성 칸디다증
3. 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식환자 및 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토콕쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토콕쿠스증.
4. AIDS 환자의 크립토콕쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법.
5. 세포독성 화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역 부전환자의 진균 감염증 예방.

**<용법·용량>**

약물투여경로는 환자의 임상상태에 따라 결정합니다.

경구제제의 흡수는 빠르고 거의 완전하게 흡수되므로, 경구제(캡슐, 건조시럽)와 주사제의 투여량은 같습니다.

이 약은 정맥주사로 약 5-10mL/min 의 속도로 투여합니다.

#### [성 인]

##### 1. 점막 칸디다증

1)구강인두 칸디다증 : 이 약으로서 보통 1 일 1 회 50mg 을 7-14 일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있습니다.

2)만성 위축성 구강 칸디다증(의치로 인한 구강내 통증) : 이 약으로서 보통 1 일 1 회 50mg 을 14 일간 투여하며. 의치의 국소소독을 병행해야 합니다.

3)기타 점막 칸디다증 (질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비침습성 기관지 폐감염증, 칸디다 뇨증, 피부점막 칸디다증 등) : 이 약으로서 보통 1 일 1 회 50mg 을 14-30 일간 투여하며 난치성 점막 칸디다증인 경우에는 1 일 100mg 으로 증량할 수 있습니다.

##### 2. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증 :

이 약으로서 보통 첫날 400mg 을 1 회 투여하고 다음날부터 1 일 1 회 200 mg 을 투여하며, 환자의 반응에 따라 1 일 400 mg 까지 증량할 수 있습니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정합니다.

3. 크립토콕쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토콕쿠스증 : 이 약으로서 보통 첫날 400 mg 을 1 회 투여하고 다음날부터 1 일 1 회 200 ~ 400 mg 을 투여합니다. 치료기간은 임상반응 및 진균학적 반응에 의해 결정되나 통상적으로 최소한 6-8 주간 투여합니다.

4. AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염 재발방지를 위해서는 환자가 기초치료를 모두 받은 후 이 약으로서 1 일 1 회씩 최소 100 mg 을 무기한 투여합니다.

5. 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전환자의 진균 감염증 예방 : 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험정도에

따라 이 약으로서 1 일 50~ 400mg 을 투여하여야 합니다. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에게는 1 일 400 mg 을 권장합니다. 이러한 환자에게는 호중구 감소증이 시작되리라고 예상되는 5-6 일전부터 400 mg 을 투여하여야 하며 호중구수가 1,000cells/ mm<sup>3</sup> 이상으로 증가된 후에도 1 주일 동안 계속 400 mg 을 투여하여야 합니다.

#### [소 아]

성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400 mg 을 초과하지 않습니다.

| 성인용량   | 소아용량     |
|--------|----------|
| 100 mg | 3 mg/kg  |
| 200 mg | 6 mg/kg  |
| 400 mg | 12 mg/kg |

단, 생후 6 개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않습니다(사용상의 주의 사항 참조).

1. 구강인두 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg 당 6mg 을 투여하고, 다음날부터는 1 일 체중 kg 당 3mg 을 투여합니다. 재발방지를 위해 최소 2 주간 투여해야 합니다.
2. 식도 칸디다증 - 이 약으로서 첫날 체중 kg 당 6mg 을 투여하고, 다음날부터는 1 일 체중 kg 당 3mg 을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1 일 체중 kg 당 12mg 까지 증량할 수 있습니다. 최소 3 주간, 증상소실 후 적어도 2 주간 투여합니다.
3. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 - 1 일 체중 kg 당 6-12mg 을 투여합니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정합니다.
4. 크립토кок쿠스 수막염 - 이 약으로서 첫날 체중 kg 당 12mg 을 투여하고, 다음날부터는 1 일 체중 kg 당 6mg 을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1 일 체중 kg 당 12mg 으로 증량할 수 있습니다. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성소견이 있을 후 10-12 주간 투여합니다.

5. AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염의 재발방지를 위해서는 환자가 기초치료를 모두 받은 후 1 일 1 회 체중 kg 당 6mg 을 투여합니다.

6. 신장애 소아는 신장애 정도에 따라 성인 신장애 환자와 동일한 기준으로 투여간격을 늘리고 용량을 줄여야 합니다. 10mg 미만의 용량을 투여할 때는 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시럽제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사 하여야 합니다.

#### [고령자]

신기능이 정상인 경우에만 보통 성인 용량을 투여하며 신기능장애가있을 때에는(크레아티닌 청소율 40 ml/min 이하) 투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 합니다.

#### [신장애 환자]

이 약은변화되지 않은 채 주로 소변을 통해 배설됩니다. 한번만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요없으나 여러번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고 다음날 부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 합니다.

| 크레아티닌 청소율(ml/min) | 권장되는 투여용량         |
|-------------------|-------------------|
| > 50              | 상용량의 100 %        |
| ≤ 50 (투석하지 않음)    | 상용량의 50%          |
| 정기적인 투석환자         | 각 투석 후에 상용량의 100% |

정기적인 투석을 받는 환자의 경우 각 투석 후에 상용량의 100%를 투여해야 합니다.; 투석을 하지 않는 날에는 크레아티닌 청소율에 따라 감량하여 투여해야 합니다.

#### <사용상의 주의사항>

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 다른 부형제, 다른 아졸계 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 다음의 약을 투여받고 있는 환자 :

- 다회용량상호작용시험결과에 근거하여, 이 약을 1 일 당 400mg 또는 그 이상 용량을 반복 투여 받고 있는 환자에게 테르페나딘과의 병용

- QT 간격 연장 시키는 약물 및 CYP3A4 에 의해 대사되는 시사프라이드, 아스테미졸, 에리트로마이신, 피모짓, 퀴니딘과의 병용
- 에르고타민, 디히드로에르고타민

## 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약물과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 신장애 환자
- 3) 간장애 환자(간기능이 악화될 수 있습니다.)
- 4) 심장질환 또는 전해질이상 등 부정맥의 가능성이 있는 환자(Torsades de pointes 를 포함한 심실빈맥, QT 연장, 심실세동, 방실차단, 서맥 등이 나타날 수 있습니다.)
- 5) 다음의 약을 투여받고 있는 환자:
  - 이 약과 1 일 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받는 환자는 신중히 모니터링 되어야 합니다.
  - 할로판트린
- 6) 이 약은 강력한 CYP2C9 억제제 및 중등도의 CYP3A4 억제제입니다. 따라서 CYP2C9 과 CYP3A4 를 통해서 대사되는 좁은 치료영역을 가진 약물과 병용 시 환자들을 모니터링 해야 합니다.

## 3. 이상반응

이 약은 일반적으로 내약성이 좋습니다.

이 약과 대조약물을 투여하는 임상시험 동안, 특히 AIDS, 암과 같이 중대한 기저 질환을 가진 일부 환자들에서 신장 및 혈액학적 기능시험 결과변화와 간장애가 관찰되었으나, 임상적 유의성과 치료와의 인과관계는 확실하지 않습니다.

이 약의 치료기간 동안 아래와 같은 빈도로 다음과 같은 이상반응이 관찰 및 보고되었습니다. :

매우 흔하게 보고된( $\geq 1/10$ ), 흔하게 보고된( $\geq 1/100 \sim < 1/10$ ), 흔하지 않게 보고된( $\geq 1/1000 \sim < 1/100$ ), 드물게 보고된( $\geq 1/10000 \sim < 1/1000$ ), 매우 드물게 보고된( $\leq 1/10000$ )

| 신체계 | 빈도 | 이상반응 |
|-----|----|------|
|-----|----|------|

|                      |        |                                                                                                            |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 혈액 및 림프계 이상          | 드물게    | 무과립구증, 백혈구감소증<br>호중구감소증, 저혈소판증                                                                             |
| 면역계 이상               | 드물게    | 아나필락시스, 혈관부종                                                                                               |
| 대사 및 영양계 이상          | 드물게    | 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증,<br>저칼륨혈증                                                                                |
| 정신계 이상               | 흔하지 않게 | 불면증, 졸림                                                                                                    |
| 신경계 이상               | 흔하게    | 두통                                                                                                         |
|                      | 흔하지 않게 | 발작, 현기증, 감각이상, 미각이상                                                                                        |
|                      | 드물게    | 떨림                                                                                                         |
| 청각 및 미로 이상           | 흔하지 않게 | 어지럼                                                                                                        |
| 심장계 이상               | 드물게    | torsade de pointes, QT 연장                                                                                  |
| 위장관계 이상              | 흔하게    | 복통, 설사, 오심, 구토                                                                                             |
|                      | 흔하지 않게 | 소화불량, 고창, 입안건조                                                                                             |
| 간·담도계 이상             | 흔하게    | ALT(Alanine aminotransferase) 증가,<br>AST(Aspartate aminotransferase) 증<br>가,<br>혈중 alkaline phosphatase 증가 |
|                      | 흔하지 않게 | 담즙울체, 황달, 빌리루빈 증가                                                                                          |
|                      | 드물게    | 간독성(드물게 치명적 경우 포함),<br>간부전, 간세포괴사, 간염, 간세포손<br>상                                                           |
| 피부 및 피하조직 이상         | 흔하게    | 발진                                                                                                         |
|                      | 흔하지 않게 | 가려움, 두드러기, 땀분비증가, 약물<br>발진                                                                                 |
|                      | 드물게    | 중독성 표피 괴사용해, 스티븐슨-존<br>슨 증후군, 급성 범발성 발진성 농<br>포증, 탈락피부염, 얼굴부종, 탈모                                          |
| 근골격계, 결합조직 및 뼈이<br>상 | 흔하지 않게 | 근육통                                                                                                        |
| 전신 이상 및 투여 부위 상<br>태 | 흔하지 않게 | 피로, 권태, 무력증, 발열                                                                                            |

#### 소아환자

소아임상시험에서 기록된 이상반응 및 실험실검사수치 이상(laboratory abnormalities)의 패턴  
과 빈도는 성인에게서 보여진 바와 유사합니다.

기

#### 4. 일반적 주의

- 1) 특히 AIDS 나 암과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 혈액학, 간장, 신장, 그 외 생화학적 기능검사의 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과의 관련성에 대해서는 확인되지 않았습니다.
- 2) 매우 드물게 이 약을 수차례 복용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 부검에서 간괴사가 관찰되었습니다. 이들 환자들은 간괴사를 유발할 수 있는 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약들을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간효소가 의미있게 증가할 경우에는 이 약 투여에 따른 위험성과 유익성을 잘 평가해야 합니다.
- 3) AIDS 환자는 많은 약물에서 중증 피부반응을 일으키기 쉽습니다. 이 약과 심한 표피박탈에 관련이 있다고 알려진 다른 약물을 복합 투여한 결과 소수의 에이즈 환자에서 그러한 피부반응의 증가가 확인되었습니다.
- 4) 신장에 환자에게 투여할 경우 투여 전에 크레아티닌 청소율을 측정하여, 투여량과 투여 간격을 조절하는 등 주의합니다.
- 5) 이 약 투여 전에 혈액검사, 신기능검사, 간기능검사, 혈중 전해질검사 등을 실시하는 것을 권장합니다.

#### 5. 상호작용

**이 약과 다음 약물을 병용투여하지 않습니다.**

- 시사프라이드: 이 약과 시사프라이드 병용투여 시 Torsade de Pointes 를 포함한 심혈관계 이상반응이 보고되었습니다. 이 약(200mg 씩 1 일 1 회 투여)과 시사프라이드(20mg 씩 1 일 4 회 투여) 병용투여 한 통제된 임상시험에서 시사프라이드의 혈장농도 증가 및 QTc 간격 연장이 나타났습니다. 따라서 이 약과 시사프라이드를 병용투여하지 않습니다.

- 테르페나딘: 테르페나딘과 함께 아줄게 항진균제를 투여 받는 환자에서 QTc 간격 연장에 따르는 중증 심부정맥이 발생되었으므로, 약물상호작용시험이 수행되었습니다. 이 약을 1 일 200mg 투여 한 시험은 QTc 간격 연장을 입증하지 못했습니다. 또 다른 시험(이 약 1

일 400mg, 1 일 800mg 투여)은 테르페나딘을 병용 시 이 약 1 일 400mg 또는 그 이상 용량의 투여가 테르페나딘의 혈중 농도를 상당히 증가시킴을 보였습니다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않습니다.

- 아스테미졸: 이 약과 아스테미졸의 병용은 아스테미졸의 청소율을 감소시킬 수 있습니다. 아스테미졸의 혈장농도의 증가는 QT 연장 및 드물게 torsade de pointes 를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 아스테미졸을 병용투여하지 않습니다.

- 피모짓: in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피모짓의 병용투여가 피모짓의 대사억제를 유발시킬 수 있습니다. 증가된 피모짓 혈장농도는 QT 연장 및 드물게 torsades de pointes 를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 피모짓은 병용투여하지 않습니다.

- 퀴니딘: in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴니딘의 병용투여는 퀴니딘의 대사억제를 유발시킬 수 있습니다. 퀴니딘의 투여는 QT 연장과 드물게 torsades de pointes 의 발생과 관계가 있었습니다. 이 약과 퀴니딘은 병용투여하지 않습니다.

- 에리트르마이신: 이 약과 에리트르마이신의 병용은 심독성(QT 간격 연장, torsades de pointes) 및 그에 따른 급성 심정지 위험 증가시킬 가능성이 있습니다. 이 약과 에리트르마이신은 병용투여하지 않습니다.

**이 약과 다음 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조절이 고려됩니다.**

1) 다른 약물이 플루코나졸에 미치는 영향

- 히드로클로로치아짓: 건강한 지원자를 대상으로 한 약물동력학적 상호작용시험에서 이 약과 다회용량의 히드로클로로치아짓을 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 상승하였습니다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노제를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요 하지 않습니다.

- 리팜피신: 이 약과 리팜피신을 병용투여 시 이 약의 AUC 가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌습니다. 그러므로 리팜피신과 병용 시 이 약의 증량을 고려해야 합니다.

2) 플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향

이 약은 강력한 CYP2C9 억제제 및 중등도의 CYP3A4 억제제입니다. 아래 언급한 관찰되고/입증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9 과 CYP3A4 에 의하여 대사되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험성이 있습니다. 따라서 아래 약물들과 병용 시 신중함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 합니다. 이 약의 긴 반감기 때문에 치료 중단 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4-5 일간 지속 됩니다.

- 알펜타닐: 이 약과 알펜타닐을 병용투여 한 시험에서 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용적의 감소가 관찰되었습니다. 이 같은 작용의 가능성은 이 약의 CYP3A4 억제에 있습니다. 알펜타닐의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 아미트리프틸린, 노르트리프틸린: 이 약은 아미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가시킵니다. 이 약과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5-노르트리프틸린/5-아미트리프틸린이 측정될 수 있습니다. 필요 시 아미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 합니다.

- 암포테리신 B: 감염상태의 정상 마우스와 면역이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 암포테리신 B 를 동시 투여했을 때 다음과 같은 결과를 보였습니다.: C, albican 에 의한 전신감염에서는 항진균효과가 약간 더 관찰되었음, *Cryptococcus neoformans* 에 의한 두개내감염에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, *A. fumigatus* 에 의한 전신감염에서의 두 약물의 길항 작용. 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려진 바 없습니다.

- 항응고제: 건강한 남자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 와파린 투여 후 프로트롬빈시간(12%)을 증가시켰습니다. 시판 후 조사경험에서 다른 아졸계 약물과 마찬가지로 이 약과 와파린을 동시에 병용투여 시 프로트롬빈시간 연장으로 인한 출혈경향(멍, 코피, 위장관 출혈, 혈뇨, 혈변)이 보고 되었습니다. 쿠마린계 항응고제를 투여 받는 환자에게서 프로트롬빈시간을 주의하여 모니터링 해야 합니다. 와파린의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 아지트로마이신: 18 명의 건강한 지원자를 대상으로 한 공개, 무작위, 3 방향 교차시험에서 이 약(800mg 단회 경구투여)의 약동학에 대한 아지트로마이신(1200mg 단회 경구투여)의 영향 뿐 아니라 아지트로마이신의 약동학에 대한 이 약의 영향이 평가되었습니다. 이 약과

아지트로마이신 사이에 유의한 약동학적 상호작용은 없었습니다.

- 벤조디아제핀계 약물(속효성): 미다졸람 투여 후, 이 약으로 인해 미다졸람의 농도와 정신 운동학적 효과가 상당히 증가하였습니다. 이러한 효과는 이 약의 주사제보다 경구제에서 더 두드러졌습니다. 이 약과 벤조디아제핀계 약물의 병용이 필요 시 벤조디아제핀계 약물의 감량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링해야 합니다.

이 약은 트리아졸람의 대사를 저해하기 때문에 트리아졸람(단회투여)의 AUC 를 약 50% 증가시키고 Cmax 는 20-32%, 반감기는 25-50% 증가시킵니다. 트리아졸람의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 카르바마제핀: 이 약은 카르바마제핀의 대사를 저해하며 카르바마제핀 혈청농도가 30% 증가됨이 관찰되었습니다. 카르바마제핀 독성이 발생할 위험이 있습니다. 농도 측정/효과에 따라 카르바마제핀의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 칼슘채널차단제: 특정 칼슘채널차단제(니페디핀, 이소라디핀, 암로디핀, 베라파밀, 펠로디핀)은 CYP3A4 에 의해 대사 됩니다. 이 약은 칼슘채널차단제의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있습니다. 이상반응에 대해 빈번한 모니터링이 권장됩니다.

- 췌레콕시브: 이 약(1 일 200mg)과 췌레콕시브(200mg) 병용 치료 시, 췌레콕시브의 Cmax 와 AUC 는 각각 68%, 134% 증가하였습니다. 이 약과 병용 시 췌레콕시브의 투여는 절반용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있습니다.

- 사이클로스포린: 이 약은 사이클로스포린의 AUC 와 농도를 상당히 증가시킵니다. 사이클로스포린 농도에 따라, 사이클로스포린 감량에 의해 이 약과 병용할 수 있습니다.

- 시클로포스파미드: 이 약과 시클로포스파미드의 병용요법 시 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아티닌의 증가가 나타났습니다. 혈청 빌리루빈 및 혈청 크레아티닌 상승의 위험성을 신중히 고려했을 때, 이 약과 병용할 수 있습니다.

- 펜타닐: 이 약과 펜타닐의 상호작용 가능성이 있는 치명적인 사례 한 건이 보고되었습니다. 이것은 펜타닐 중독으로 인한 사망으로 판단되었습니다. 더욱이 12 명의 건강한 지원자

를 대상으로 한 무작위, 교차시험에서 이 약이 펜타닐 제거(elimination)를 상당히 지연시킴을 보였습니다. 펜타닐 농도 상승은 호흡 억제를 일으킬 수 있습니다.

- 할로판트린: 이 약은 CYP3A4 에 대한 억제작용 때문에 할로판트린의 혈장농도를 증가시킬 수 있습니다.

- HMG-CoA 환원효소억제제: 이 약을 CYP2C9 에 의해 대사(예 : 플루바스타틴) 또는 CYP3A4 에 의해 대사(예 : 아토르바스타틴, 심바스타틴)되는 HMG-CoA 환원효소억제제와 병용투여 시 근육병증 및 횡문근융해의 위험성이 증가합니다. 병용요법이 필요할 경우 환자의 근육병증 및 횡문근융해 증상을 관찰해야 하며, 크레아티닌 키나아제(creatinine kinase)를 모니터링 해야 합니다. 근육병증/횡문근융해가 진단, 의심되거나 크레아티닌 키나아제의 현저한 증가가 관찰된다면 HMG-CoA 환원효소억제제 투여를 중단해야 합니다.

- 로자탄: 이 약은 치료기간 동안, 로자탄이 안지오텐신 II 수용체길항작용의 대부분을 담당하는 활성대사체(E-31 74)로 대사되는 것을 방해합니다. 환자들은 계속해서 혈압을 모니터링 해야 합니다.

- 메사돈: 이 약은 메사돈의 혈청농도를 증가시킬 수 있습니다. 메사돈의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs): 플루비프로펜 단독 투여에 비해 이 약과 병용투여 시 플루비프로펜의 Cmax 와 AUC 가 각각 23%, 81% 증가하였습니다. 이와 유사하게 라세믹 이부프로펜(400mg)단독투여에 비해 이 약과 병용 시 약물학적 활성 이성체인 [S-(+)-이부프로펜]의 Cmax 와 AUC 가 각각 15%, 82% 증가하였습니다.

특히 연구된 바는 없지만, 이 약은 CYP2C9 에 의해 대사되는 다른 NSAIDs(예 : 나프록센, 로록시캄, 멜록시캄, 디클로페낙)의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있습니다. 이상반응과 NSAIDs 관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장됩니다. NSAIDs 의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 경구용 피임제: 다회용량 플루코나졸과 경구용 피임제와 병용에 관해 두 가지의 약동학적 연구가 수행되었습니다. 이 약 1 일 200mg 투여 시 ethinyl estradiol 과 levonorgesterol 의

AUC 가 각각 40%, 24% 증가한 반면, 이 약 50mg 을 투여한 연구에 있어서는 호르몬 수치에 관련된 영향을 끼치지 않았습니다. 따라서 위의 용량과 같은 다회용량의 플루코나졸 투여는 경구용 피임제의 효능에 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다,

- 페니토인: 이 약은 페니토인의 간대사를 저해합니다. 이 약과 병용투여 시 페니토인 독성을 피하기 위해 페니토인의 혈청농도를 모니터링 해야 합니다.

- 프레드니솔론: 프레드니솔론을 투여 받던 간이식 환자에게서 이 약을 3 개월간 치료 후 중단 시, 급성 부신피질 기능저하가 발생했다는 사례가 보고되었습니다. 이 약의 중단에 의해 CYP3A4 의 활성상승이 야기되어 프레드니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 예측됩니다. 이 약과 프레드니솔론을 장기간 투여 받은 환자는 이 약의 중단 시 부신피질 기능저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 합니다.

- 리파부틴: 이 약과 리파부틴 병용 시 리파부틴의 혈청 농도가 80%까지 증가한다는 상호작용 보고가 있었습니다. 이 약과 리파부틴을 병용한 환자에게서 포도막염이 보고되었습니다. 이 약과 리파부틴을 병용 시 환자를 신중히 모니터링 해야 합니다.

- 사퀴나비르: 이 약은 P-glycoprotein 저해 및 CYP3A4 에 의한 사퀴나비르 간대사 저해에 의해 사퀴나비르의 AUC 와 Cmax 를 각각 약 50%, 약 55% 증가시키며 사퀴나비르의 청소율을 약 50% 감소시킵니다. 사퀴나비르의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

- 시롤리무스: 이 약은 아마도 CYP3A4 와 P-glycoprotein 을 통한 시롤리무스의 대사를 저해하므로써 시롤리무스의 혈장농도를 증가시킵니다. 효과/농도 측정에 따른 시롤리무스의 용량조절을 고려하여 이 약과 병용할 수 있습니다.

- 설폰닐요소계: 건강한 지원자에 대해 이 약과 병용투여 시 설폰닐요소계 약물(예 : 클로르프로파미드, 글리벤클라미드, 글리피짓, 톨부타미드)의 혈청반감기 연장을 보였습니다. 이 약과 설폰닐요소계 약물 병용투여기간 동안 혈당에 대한 빈번한 모니터링과 설폰닐요소계 약물의 적절한 감량이 권장됩니다.

- 타크롤리무스: 이 약은 장에서 CYP3A4 에 의한 타크롤리무스의 대사를 저해시킴으로서

경구 투여된 타크롤리무스의 혈청농도를 5 배까지 증가시킵니다. 타크롤리무스를 정맥 내로 투여했을 때에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았습니다. 증가된 타크롤리무스의 농도는 신독성과 연관이 있습니다. 타크롤리무스의 농도에 따라 경구로 투여되는 타크롤리무스의 용량을 감소시켜야 합니다.

- 테오필린: 위약 대조 상호작용 시험에서 이 약 200mg 를 14 일 동안 투여 시 테오필린의 평균혈장청소율이 18% 감소하였습니다. 고용량의 테오필린을 투여 받거나 테오필린 독성발생 위험이 증가된 환자들은 이 약을 투여 하는 동안 테오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타날 시에 치료방법은 적절히 수정되어야 합니다.

- Vinca 알칼로이드계 약물: 연구된 바가 없으나, 이 약의 CYP3A4 억제 가능성에 기인하여 이 약은 vinca 알칼로이드계 약물(예 : 빈크리스틴, 빈블라스틴)의 혈장농도 상승과 신독성을 일으킬 수 있습니다.

- 비타민 A: 이 약과 모든 trans-retinoic acid (비타민 A 의 산성형)의 병용투여를 받는 환자들로부터 보고된 사례에 따르면 중추신경계(CNS)와 관련해 의도하지 않았던 이상반응으로서 가성 뇌종양이 나타났으며, 그것은 이 약의 치료 중단 후에 사라졌습니다. 이 약과의 병용이 중추신경계 관련 이상반응이 있음을 명심하십시오.

- 지도부딘: 이 약이 경구용 지도부딘의 청소율을 약 45% 감소시킴에 따라 지도부딘의 Cmax 와 AUC 를 각각 84%, 74% 증가시킵니다. 지도부딘의 반감기는 이 약과의 병용 후에 약 128%까지 연장됩니다. 이 약과 지도부딘을 병용투여 받는 환자들은 지도부딘 관련 이상반응 발생에 대해 모니터링되어야 합니다. 지도부딘의 감량이 고려될 수 있습니다.

- 내인성스테로이드: 이 약 1 일 50mg 투여는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았습니다. 1 일 200-400mg 투여는 건강한 남성 지원자의 부신피질 자극 호르몬 자극반응이나 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았습니다.

- 보리코나졸(CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 저해제): 이 약의 경구용 제제(첫째날 400 mg 투여 후, 4 일 동안 24 시간 마다 200 mg 투여)와 경구용 보리코나졸(첫째날 12 시간마다 400 mg 투여 후, 2.5 일 동안 12 시간마다 200 mg 투여)을 6 명의 건강한 남성 피험자에게 병용

투여 시 보리코나졸의 C<sub>max</sub> 와 AUC 는 각각 평균적으로 57%(90% CI: 20%, 107%), 79%(90% CI: 40%, 128%) 증가했습니다. 이에 이어진 8 명의 건강한 남성 피험자를 포함한 임상시험에서 보리코나졸과 플루코나졸의 투여량 감소 그리고/또는 투여빈도 감소는 이러한 작용을 없애거나 감소시키지 못했습니다. 이 약과 보리코나졸의 병용투여는 어떠한 용량에서도 권장되지 않습니다.

- 상호작용시험은 이 약의 경구제와 음식, 시메티딘, 제산제, 골수이식에 대한 전신방사선요법과의 병용 시 임상적으로 유의할만한 이 약의 흡수장애가 일어나지 않음을 보였습니다.

- 처방의는 이 약과 상호작용시험이 수행되지 않은 다른 약물들에 대해서도 상호작용이 일어날 수 있음을 인지하여야 합니다.

## 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

### 임부

임신 첫 3 개월 (1<sup>st</sup> trimester)에 플루코나졸 200mg 이하 용량 (단회 또는 반복투여)으로 치료받은 임산부 수백명의 자료에 의하면, 이 약으로 인해 태아에게 바람직하지 않은 영향은 없었습니다.

콕시디오이데스진균증에 대해 3 개월 또는 그 이상의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1 일 400-800mg)을 투여 받은 임산부의 경우, 영아에서 다발성 선천성 기형이 보고 되었습니다. 플루코나졸의 사용과 이러한 부작용 발생 사이의 상관성은 명확하지 않습니다. 동물에서는 모체에 독성이 나타날 정도의 고용량에서만 태자에 대한 부작용이 확인되었습니다, 5mg/kg 또는 10mg/kg 의 용량은 태자에 영향을 끼치지 않았습니다.; 25mg/kg, 50mg./kg 및 그 이상의 용량에서 태자의 해부학적인 변형(과잉늑골, 신우확장) 증가 및 골화 지연이 관찰되었습니다. 80mg/kg(사람 권장용량의 약 20-60 배) - 320mg/kg 의 용량범위에서 랫트의 배자치사 (embryoletality)가 증가하였으며 과형늑골, 구개열, 비정상적인 두개안면부 골화를 포함한 태아의 기형이 있었습니다. 이러한 영향들은 랫트에서의 에스트로겐 합성 억제 시 동일하게 나타나며, 임신, 기관발생, 분만 시는 에스트로겐 농도가 낮아짐으로 인한 이미 알려져 있는 결과 때문일 수 있습니다.

발표된 몇몇의 증례보고는 임신 첫 3 개월 (1<sup>st</sup> trimester)의 모든 또는 대부분의 기간 동안 고용량의 플루코나졸(1 일 400-800mg)을 투여 받은 임신부의 영아에서 두드러지고 드문 형태의 출생기형(birth defects)이 나타남을 기술하고 있습니다. 이러한 영아에서 발견되는 특징은 다음을 포함합니다.; 납작머리증, 비정상적 얼굴, 비정상적 머리뒤통개뼈 발달, 구개열, 대퇴부 휨(femoral bowing), 얇은 갈비뼈, 긴뼈, 관절굽음증, 선천적 심장 질환

임부에 대한 이 약의 투여는 피해야 합니다.

#### 수유부

이 약은 혈장과 비슷한 농도로 모유에서 발견되었습니다. 따라서 수유부에 있어 이 약의 투여하지 않습니다.

#### 7. 소아에 대한 투여

생후 6 개월 미만의 영아에 대한 이 약의 안전성, 유효성은 확립되지 않았습니다. 그러나 일부 소수(생후 1 일부터 6 개월까지의 29 명)의 영아에서 이 약이 안전하게 사용되었다는 자료가 있으므로 이 약 투여가 꼭 필요하다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

#### 8. 운전과 기계 조작 능력에 미치는 영향

운전 및 기계 조작 시 때때로 현기증 및 발작이 일어날 수 있으므로 주의해야 합니다.

#### 9. 과량투여시의 처치

- 1) 이 약을 과량복용 시 환각, 편집적 행동이 나타났다는 보고가 있었습니다.
- 2) 과량투여 시 대증요법(필요 시 지지요법 및 위세척)이 적합할 수 있습니다
- 3) 이 약은 대부분 소변으로 배설되므로 소변양을 증가시키면 이 약의 배설율은 증가할 것입니다. 3 시간동안 혈액투석을 하면 이 약의 혈장농도가 거의 50%정도 감소됩니다.

#### 10. 적응상의 주의

이 약은 액상이므로 희석이 필수적인 것은 아니지만 필요에 따라 다른 용액과 혼합하여 투여할 경우 아래와 같은 용액이 적합합니다.

- 1) 20% 포도당주사액

- 2) 링거주사액
- 3) 하트만주사액
- 4) 염화칼륨 함유 포도당 주사액
- 5) 중탄산나트륨 주사액
- 6) 0.9% 생리식염수

이 약은 상기 용액의 기존 투여경로를 이용하여 함께 주입될 수 있으며 이에 따른 상호작용은 보고된 바 없습니다. 그 밖에 다른 약물 및 수액과의 사전혼합은 권장되지 않습니다.

#### <교 환>

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.

#### [포장단위]

100 mg : 1 바이알

#### [저장방법]

밀봉용기, 실온보관 (1~30°C)

#### [유효기한]

외부포장을 참조하여 주십시오.

\* 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해 보상규정에  
의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.  
전화번호(대표) 02-317-2114  
(수신자부담) 080-022-1400

개정년월일 : 2012. 12. 04

작성년월일 : 2001. 05. 10

KI1312

## [제조원]

전공정위탁제조(제조의뢰자):

Pfizer Holding France, 23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75668 Paris CEDEX 14, France

전공정위탁제조(제조자):

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries - 37530, Poce Sur Cisse, France

## [수입원]

한국화이자제약

서울시 중구 퇴계로 110

대표전화 02) 317-2114

<가장 최근 개정된 제품설명서의 내용은 당사 홈페이지([www.pfizer.co.kr](http://www.pfizer.co.kr))를 통해 확인하실 수 있습니다.>