



졸음걱정없는, 효과빠른 항히스타민제

알레틴 정

Alletin Tab.

(로라타딘)

알레틴정의 주성분인 로라타딘은 1988년 Belgium에서의 첫 발매이후 현재 95개국에서 널리 사용되고 있으며 미국의약품집(PDR)등에 수재되어 그 유효성과 안전성이 입증된 항히스타민제입니다.

알레틴정은 Allergic reaction의 early phase와 late phase양쪽에서 allergy의 원인을 차단함으로써 복용후 30분 이내에 신속한 효과를 나타내며, 타 제제와 다른 독특한 화학구조를 가지고 있어 24시간 약효가 지속되므로 1일 1회 복용으로 간편하게 투약할 수 있습니다. 또한, 현저한 선택적, 상경적 말초 anti-H₁ receptor작용으로 Non-Sedating(항진정)효과를 나타내어 수험생이나, 운전자에게도 안심하고 투여할 수 있습니다.

■ 원료약품 및 그 분량 이 약 1정 중,

로라타딘 (식약청고시) 10mg

■ 성 상

백색의 원형 정제

■ 효능 · 효과

알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감), 만성 특발성 두드러기

■ 용법 · 용량

- 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg(1정)을 경구투여합니다.
- 6~12세 미만의 소아
 - 체중 30kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg(1정) 투여합니다.
 - 체중 30kg 이하 : 이 약으로서 1일 1회 5mg(1/2정) 투여합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 6세 미만의 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

간장애 또는 신부전 환자

3. 이상반응

이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고되었습니다. 그 밖에 말초증, 아나필락시스, 간기능장애, 상설성 부정빈맥 등이 나타났습니다.

4. 일반적 주의

만일 피부자극시험을 할 경우에는 항히스타민제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 4일 전에는 투여하지 않습니다.

5. 상호작용

이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴닌, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중농도가 높아집니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.
- 2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않습니다.

7. 과량 투여시의 처치

과량을 투여했을 때에는 즉시 대증요법과 지지요법을 시작하여야 합니다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 합니다. (토관을 이용하는 방법이 우선적으로 사용됩니다.) 그러나 위식장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안됩니다. 구토 후에 활성탄과 물을 회석하여 투여할 수도 있습니다. 만일 구토가 성공적이지 못하거나 금기사항일 경우는 위세척을 실시하여야 합니다. 이 약은 투석으로는 제거되지 않습니다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 합니다.

■ 저장방법 · 사용기한

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위 1, 10, 30, 50, 100, 1000정

■ 제조 · 판매원 한울제약주식회사

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

ALT-I-1
06-12-22

HANALL 
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 성서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr