



치질·정맥질환 치료제

베노론

캡슐

(디오스민)

베노론 캡슐은 경구용 치질 및 정맥질환 치료제로서 진통, 진압, 항부종, 항출혈, 울혈해소 등의 작용을 가지고 있으며 치질수술을 하지않고 경구투여로 치질부위의 통증이나 부종, 소양감, 출혈등의 재증상이 신속히 해소되며 또한 일상생활에 불편없이 짧은 기간내에 근원적으로 치료하는 경구용 고단위 치질치료제입니다.

■ 원료약품 및 그 분량 이 약 1 캡슐 중,

디오스민(B.P) 300mg

■ 성 상

황백색 내지 황색의 분말 또는 분말상의 과립이든 상하백색의 캡슐제임

■ 약리작용

1. 장매내 혈류정체현상을 감소시켜서 환부의 통증, 부종, 울혈증상 등을 신속히 경감시킵니다.
2. 모세혈관의 투과성을 억제하고 저항성을 증가시켜 정맥질환으로 인한 출혈, 치질부위의 출혈, 모세혈관의 파열성 출혈, 부인과 출혈 등을 강력히 지혈 시킵니다.
3. 치질발작, 급만성 치질 및 출산후 항문부종 등을 경구투여에 의해 근원적으로 치료하는 원인요법제 입니다.
4. 소화장애를 유발하지 않고 체내에서 흡수 및 분포가 양호하며 부작용이나 금기사항 없이 정맥질환을 치료합니다.
5. 1일 2회, 1회 1캡슐씩 점심, 저녁에 경구투여 요법으로 편리하게 사용할 수 있으며 특히 치질의 재발이나 악화시에 1일 4~6 캡슐의 고용량을 투여할 수 있습니다.

■ 효능·효과

1. 치질
2. 다음 질환에 의한 여러 증상 (하지중압감, 동통, 부종 등)의 개선 : 정맥류, 정맥부전 (임신시 포함), 정맥염후증후군
3. 모세혈관취약증에 의한 출혈증상 : 자반증

■ 용법·용량

성인 : 디오스민으로서 1회 300mg 1일 2회 (점심, 저녁식사시) 경구투여합니다. 치질의 재발이나 악화시에는 1일 1200~1800mg까지 투여할 수 있습니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감 합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투약하지 마십시오.
이 약에 과민증환자
2. 이상반응
위장장애, 과민성 피부발진, 심계항진, 어지러움, 두통, 코·입의 건조감 등이 나타날 수 있습니다.
3. 임부에 대한 투여
임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않습니다.

■ 저장방법·사용기한

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 / 외부포장에 표시된 사용 기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위

30, 50, 100, 300, 500캡슐

■ 제조·판매원 한울제약주식회사

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변색, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

VNR-1-7
07-11-08

HANALL
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr