



강력한 인산결합제

포슬로[®] 정

PhosLo[®] Tab.

(초산칼슘)

포슬로정은 말기 신부전 환자의 고인산혈증에 처방되는 초산칼슘제제로 미국 FDA에서 안전성과 유효성이 입증된 강력한 인산결합제입니다. 기존의 칼슘제제와 비교시 인산결합력이 거의 3배정도이며 용해도 또한 우수하여 산, 알칼리에 관계없이 용해되고 체내 이용을 또한 우수합니다.

■ **원료약품 및 그 분량** : 이 약 1정 중,
초산칼슘(U.S.P.) 710mg
(무수물로서 667mg)

■ **성상** 백색의 원형정제

■ 특징

1. 미국 FDA에서 안전성과 유효성을 입증받은 강력한 인산결합제입니다.
2. 국내 유일의 고인산혈증 적응증을 가진 인산결합제입니다.
 - 기존 칼슘제제와 비교시 인산결합력이 거의 3배정도 강력합니다.
 - 종래의 칼슘제제와 비교시 산, 알칼리에 관계없이 약 10,000배의 용해도를 나타내어 위장관에서의 인산 결합력이 뛰어나며 체내 이용율이 우수합니다.
3. 고칼슘혈증과 같은 이상반응 발현율이 극히 낮습니다.

■ 효능·효과

말기 신부전 환자의 고인산혈증

■ 용법·용량

- 1) 초기용량 : 매 식사중 2정씩 경구로 복용합니다.
- 2) 유지용량 : 고칼슘혈증을 유발하지 않는 상태에서 혈중인산의 농도가 6mg/dL 이하가 될 때까지 용량을 점차 증가시킵니다. 통상, 식사중 3~4정을 경구로 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
고칼슘혈증 환자
2. 이상반응
고칼슘혈증을 유발할 수 있으며 경증의 고칼슘혈증($\text{Ca} > 10.5\text{mg/dL}$)은 무증상이거나 변비, 식욕부진, 오심, 구토를 일으킬 수 있으며 중증은 착란, 지각탈실, 혼수 등을 일으킬 수 있습니다. 경증일 경우는 복용량을 줄이거나 복용을 중지하고 중증일 경우는 복용을 중지하고 혈액투석을 실시합니다.
3. 일반적 주의
 - 1) 이 약의 복용량은 초기에 결정하여 필요에 따라 조정합니다.
 - 2) 이 약의 과량투여는 고칼슘혈증을 유발할 수 있으므로 용량을 결정하는 치료 단계에 혈중 칼슘농도를 1주일에 2번씩 측정합니다.
 - 3) 고칼슘혈증은 심부정맥을 촉진할 수 있기 때문에 디기탈리스를 투여하는 환자에게는 이 약을 투여하지 않습니다.
 - 4) 혈중 인산농도는 정기적으로 측정하여야 합니다.
 - 5) 비처방된 제산제의 복용은 피합니다.
 - 6) 인산과 결합한 칼슘은 66을 넘지 않아야 합니다.
4. 상호작용
이 약은 테트라사이클린의 생물학적 활성을 낮출 수 있습니다.
5. 임부 및 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약을 투여하여 실시한 동물실험에서는 최기형성이 나타나지 않았으나 임부에게 투여할 경우에는 유익성이 위험성을 상회할 경우에만 투여합니다.
 - 2) 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되어 있지 않습니다.
6. 기타
고칼슘혈증의 증상을 환자에게 인지시켜 주의하도록 합니다.

■ 저장방법·사용기한

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■ 포장단위 30, 50, 100, 200, 500정 ■ 제조·판매원 한울제약주식회사

※ 복용상 주의 : 씹어서 복용하지 마시고 물과 함께 복용하십시오.

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

PSL-I-6
07-01-22

HANALL 
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr