



SINCE 1945

전문 의약품

티로파[®]주

(염산 티로프라미드)

위장관운동 정상화제

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.
사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【약리기전】

c-AMP는 근육세포내에서 근육축에 필요한 칼슘이온을 조절함으로써, 근세포의 이완・수축을 조절합니다. 티로파는 평활근 세포내 아데닐사이클라제(Adenylcyclase)를 활성화시켜 c-AMP의 양을 증가시킴으로써 각종 평활근의 과도 수축에 의한 경련성 통증을 제거합니다.

【성분・함량】 - 1앰플(3밀리리터) 중 -

염산 티로프라미드(별규) 50mg
(Tiropramide hydrochloride)

【성상】 이 약은 무색투명한 유동성 액체가 갈색 앰플에 든 주사제입니다.

【효능・효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통:
간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장・요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통:
위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법・용량】

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 50mg(3mL)을 근육 또는 정맥주사 합니다.
필요에 따라 1시간 후에 반복 투여할 수 있습니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자분에게는 투여하지 마십시오.
 - 1) 외부자극으로 인해 위장관이 협착된 환자분
 - 2) 거대결장, 허탈환자분
 - 3) 이 약에 과민증 환자분
 - 4) 중증의 간부전 환자분
2. 다음의 환자분에게는 신중히 투여 하십시오.
항콜린 작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자분에게는 신중히 투여해야 합니다.
3. 부작용
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지해야 합니다.
4. 상호작용
혈압강화 약물을 투여받는 환자분에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의해야 합니다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여해야 합니다.

6. 적응상의 주의

저혈압 환자분에게 정맥주사하는 경우에는 천천히 주사해야 합니다.

7. 경고

앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의하십시오.

【저 장 방 법】 차광밀봉용기 저장하십시오.

【포 장 단 위】 4, 10, 20, 30, 50 앰플

【사 용 기 간】 5년입니다.

※ 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효(사용)기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부 고시(소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9

 **주식 대웅제약**
경기도 성남시 중원구 상대원동 223-23

Processed under agreement with
 **Rotta Pharmaceuticals**

설명서 작성년월일: 1990.01.18
설명서 개정년월일: 2002.07.24
제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.