관절염 · 류마티즘 치료에 ——

에어탈 정

에어탈 정은 골관절염이나 류마티스 관절염, 강직성 척추염등 각종 관절질환은 물론 통증을 수반한 각종 질환에 널리 사용할 수 있는 소염진통제입니다. 에어탈 정은 위장장애가 극소화되어 장기복용이 가능하고, 항염 및 진통효과가 우수 할 뿐만아니라 관절연골생성을 촉진하기 때문에 만성적 관절질환에 특히 우수한 효과를 발휘합니다.

【특징 및 약리작용】

1. **위장장애가 극소화되었습니다.**
   에어탈은 염증을 유발하는 Prostaglandin의 차단작용은 강한 반면 위점막을 보호하는 Prostaglandin의 차단작용은 약합니다. 따라서 장기복용해도 위장장애같은 부작용이 적습니다.
2. **연골파괴를 방지하므로 관절질환에 적합합니다.**
   에어탈은 관절에서 연골파괴를 촉진하는 Interleukin-1의 생성을 차단할 뿐만아니라 관절연골성분의 생성을 촉진하므로 관절이 악화되는 것을 방지할 수 있습니다.
3. **항염 · 진통효과가 우수합니다.**
   에어탈은 관절등과 같은 염증조직에 약물침투가 잘되기 때문에 병소부위에서의 염증 및 통증 유발물질인 Prostaglandin 차단효과가 강력합니다. 따라서 항염 진통효과가 우수합니다.
4. **약효가 오래 지속되기 때문에 1일 2회 투여로도 충분한 효과를 발휘합니다.**

【성분 · 함량】 -1정중-

아세클로페낙(약전) ····· 100.0mg

【성　　상】 코팅된 흰색의 정제

【효능 · 효과】

류마티스양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음, 외측 절개 수술 후, 분만 후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증

【용법 · 용량】

통상 성인의 경우 1회 1정, 1일 2회(12시간마다) 복용합니다.
단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있습니다.
반드시 정제는 씹어먹지 않도록 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.
   (1)본 제제 또는 같은 계열의 일부약물(디클로페낙)에 대해 알레르기 증상이 있는 환자
   (2)다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식환자
   (3)활동성 위십이지장 궤양이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   (1)위장관의 질병이나 과거 위궤양 경험이 있는 환자
   (2)심한 간경련, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자
   (3)이뇨제를 복용중인 환자
   (4)외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자
   (5)고령자
4. 부작용
   일시적으로 경미한 위복부통증, 구토, 오심, 위부포만감등이 나타나며 때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
   현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피하십시오.

6. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나 환자가 다른 약물 특히 리튬이나 digoxin, 항응고제, 경구용 당뇨병제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의하도록 하십시오

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

(1)임산부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

(2)6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않습니다.

8. 과량투여시의 처치

과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나, 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야하며, 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련등에 대비하도록 하십시오.

【저장방법】 실온, 기밀보관

【포장단위】 10, 30, 60, 100, 500정
(의료보험용 : 10, 60, 500, 1000, 2500정)

【사용기간】 3년

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 유통 과정중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 소비자보호법에 의한 피해보상규정(재정경제부 고시 제1996-3호)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

■ 수신자부담 전화 : 080-550-8308～8309

■ 지역별 대웅제약 소비자보호센타

- 서울 : 02) 550-8308～9
- 광주 : 062) 268-7511～3
- 대전 : 042) 623-3356～8
- 부산 : 051) 466-6725～8
- 대구 : 053) 767-5581～3

설명서 작성년월일 : 1995.02.22
설명서 개정년월일 : 2003.08.18
제품의 사용기한은 외부용기에 표기
http://www.daewoong.co.kr

주식회사 대웅제약
경기도 화성시 향남면 상신리 906-10

Manufactured Under Licence From
Almirall Prodesfarma